

しっしん・かゆみ・虫さされに

第2類医薬品

しっしん，皮ふ炎治療薬

## SD軟膏「シオノギ」®

## シオノギ製薬

SD軟膏「シオノギ」は、副腎皮質ホルモン外用剤で、皮ふの赤み、かゆみにすぐれた効きめを発揮しますが、この種類の外用剤は、長期間\*続けて使用しますと、皮ふに悪い影響を与えることがあります。

\*使用上の注意 をご参照下さい。

## …… 特 徴 ……

- 成分が患部でよく作用するように、吸収されやすい形で軟膏中に配合されているので、しっしん、かゆみ、虫さされなどによく効きます。
- しっしん、かぶれをおこしている皮ふは刺激に敏感になっているといわれています。  
SD軟膏「シオノギ」は基剤原料にも工夫をしています。
- べとつきが少なく、うすくぬることができます。また軟膏基剤の主成分・ワセリンそのものに保護効果があります。



## 使用上の注意 ……

## してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

- 次の部位には使用しないで下さい
  - 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむしなどまたは化膿している患部
  - すり傷、切り傷
- 次の場合には使用しないで下さい
  - 美容目的の使用 (2) かぶれ防止のための化粧下、ひげそりあと
  - にきび (4) 赤ら顔(赤鼻)
  - おむつかぶれ(しっしん以外の原因によることが多い)
- 長期連用しないで下さい
  - よくなれば中止して下さい。だらだらと無用に長く使わないで下さい。
  - よくなりつつあっても1ヵ月をこえる場合は中止して医師または薬剤師にご相談下さい。
  - とくに、顔や首まわりに2週間以上の使用はさけて下さい。もし、それ以上続ける場合には医師または薬剤師にご相談下さい。

## 相談すること



- 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談下さい
  - 医師の治療を受けている人 (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
  - 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
  - 患部が広範囲の人 (5) 湿潤やただれのひどい人
  - 妊婦または妊娠していると思われる人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談下さい
  - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ(患部)	みずむし・たむしなどの白せん症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

## …… 効能・効果 ……

しっしん、かゆみ、虫さされ、かぶれ、ただれ、皮ふ炎、あせも、じんましん、しもやけ

…… 用法・用量 ……

1日1～3回 適量を患部に塗布して下さい。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないようにご注意下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用のみに使用し、内服しないで下さい。
- (5) ごしごしすりこまないで、のぼすようにうすくぬって下さい。  
(あつめにぬっても効きめが高まるわけではありません)
- (6) 始めは1日に2～3回ぬり、よくなるにつれて回数をへらして下さい。

…… 成分・分量 ……


SD軟膏「シオノギ」は、透明感のあるにおいのない白色の油性軟膏で、1g中に次の4種の成分を含有しています。

成 分	含量(1g中)	は た ら き
デキサメタゾン酢酸エステル	0.25 mg	副腎皮質ホルモンの一つで、炎症をおさえ、かゆみをしずめる
クロルヘキシジン塩酸塩	1 mg	細菌の感染を防ぎ、しっしんやかぶれの悪化を防ぐ
グリチルレチン酸	3 mg	炎症をしずめ、デキサメタゾン酢酸エステルの抗炎症作用を高める
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	5 mg	血液の流れをよくするほか、炎症の拡大を防ぐ

添加物として 白色ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、ソルビタン脂肪酸エステルを含有しています。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないで下さい。



…… 日常の心がけ(しっしん、皮ふ炎の場合) ……

<p>■衣類</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●かゆみをおこすような下着(毛・化繊)をさける。木綿などがよい。</li></ul>	<p>■刺激</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●かきむしらない。</li><li>●汗、寒冷、日光などの刺激をさける。</li></ul>	<p>■入浴</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●刺激の少ない良質の石けんで軽く洗う。</li><li>●ぬるめの湯に入る。</li></ul>	<p>■食事</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●香辛料、アルコール飲料などの刺激物をさける。</li></ul>
---	---	---	--

…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。  
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」  
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450  
受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

…… 包 装 ……

SD軟膏「シオノギ」：4.5g、9g

®：登録商標

製造販売元

塩野義製薬株式会社  
大阪市中央区道修町3丁目1番8号