

指定医薬部外品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

カルシウムを主たる有効成分とする保健薬

コールカップ[®]Ca

グルコン酸カルシウム水和物配合

特徴

コールカップCaは、液体タイプの分割カルシウム剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部膨満感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
軟便、下痢、便秘
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

- 次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質^{せんびょうしつ}、腺病質^{せんびょうしつ}*
- 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止^{せうじやく}

※「腺病質^{せんびょうしつ}」とは、体格繊細、貧血などになりやすい虚弱・無力体質を示します。

【用法・用量】

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	25mL	1 ~ 2 回
11才以上15才未満	13mL	
7才以上11才未満	10mL	
3才以上7才未満	5mL	
1才以上3才未満	3.5mL	
1才未満	服用しないこと	

※添付の計量コップをご使用ください。

(裏面につづく)

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を守ること（他のカルシウムを含有する製品を同時に使用する場合には、過剰摂取等に注意すること。）。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) ビンに直接口をつけて飲まないこと。
- (4) 計量カップに注いだ薬液をビンに戻さないこと。
- (5) 開栓後、味・においにより明らかな変化があり異常を感じた場合は、直ちに服用を中止すること。

〔成分・分量〕

1 日量（50mL）中

成 分	含 量
グルコン酸カルシウム水和物	3,750mg 〔カルシウム(Ca ²⁺)として335.2mg〕


添加物として白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、希塩酸、安息香酸Na、パラベン、香料を含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

気温や液温等により多少の色、味、香り等が異なる場合があります。


〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない室温の所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また、使用期限内であっても、開栓後は品質を保持するため用法・用量を守りなるべく早く服用すること。
- (5) 薬液を添付の計量カップに注いだ後は、ビンの口をよく拭いて清潔にすること。また、使用した計量カップは、その都度、水でよく洗うこと。
- (6) 水およびその他の異物が混入しないように注意すること。



－ 日常の心がけ －

① 日光浴をする等、適度に日光に当たりますよう。



② たばこ、酒類、コーヒー等の嗜好品を取過ぎない様心掛けましょう。



③ 適度な運動をして、筋肉や骨を鍛えましょう。



お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 牛津製薬株式会社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2