

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉體疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

大人(15才以上)1日1回1ビン(100mL)を服用してください。
<用法・用量に関連する注意>用法・用量を厳守すること
(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取などに注意すること。)

【成分・分量】

1ビン(100mL)中、次の成分を含有します。コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・100mg/タウリン・1,000mg/ピリドキシン塩酸塩(V.B6)・10mg/ニコチン酸アミド・20mg/イノシトール・50mg/グルコン酸カルシウム水和物・100mg/無水カフェイン・50mg/(アルコール)0.1mL以下
添加物として白糖、水アメ、D-ソルビトール、ハチミツ、クエン酸水和物、酒石酸、DL-リンゴ酸、コハク酸、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、黄色4号(タートラジン)を含有します。



コンドロイチン・タウリン配合

レバコール ドリンク液

LEVERCOL DRINK

滋養強壮
虚弱体質
肉體疲労

100mL

指定医薬部外品

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

【お問い合わせ先】

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記のお客様相談室までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

使用期限

製造番号

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
お客様相談室 03(3370)7174(代表)
製造販売元 牛津製薬株式会社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2



4 976084 060833