

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

外用痔疾用薬 **ヘモスカット坐薬**

第②類医薬品

《ヘモスカット坐薬の特徴》

ヘモスカット坐薬は患部の炎症を抑えるヒドロコルチゾン酢酸エステル、痛みを鎮めるリドカイン、血行を改善するトコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)など、痔の治療に有効な5つの成分を配合しています。痔の痛み、かゆみ等に適した坐剤です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

2. 長期運用しないこと

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことのある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

《効能・効果》 きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和


《用法・用量》 15歳以上：1回1個を肛門内に挿入する。なお、1日3回まで使用できる。

《用法及び用量に関する注意》


- (1) 小児には使用させないでください。
- (2) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。
また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (3) 肛門にのみ使用してください。

《坐薬の簡単な挿入方法》

1個をミシン目から切り離し、上部を左右に引き剥がして坐薬を取り出してください



先のとがった方を肛門内に挿入し、奥まで入れてしばらく(4~5秒)押さえてください
※中腰でお腹に力を入れないようにし、肛門内に十分さし込んだ後、立ち上がると簡単に挿入できます



《成分・分量と作用》 本品 1個(1.65g)中

成 分	分 量	作 用
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg	患部の炎症をおさえ、はれ・かゆみを鎮めます。
リドカイン	50mg	患部の痛み、かゆみをおさえます。
酸化亜鉛	165mg	患部を保護し治療を助けます。
トコフェロール酢酸エステル	30mg	血行を改善し、うっ血を防ぎます。
アラントイン	15mg	患部の組織を修復し、治りをはやめます。

(添加物としてハードファットを含有する)

《保管及び取扱い上の注意》

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に開封せずに保管してください。(夏は冷蔵庫の中に保管してください。)
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
株式会社 雪の元本店 お客様相談室
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土曜、日曜、祝日を除く)
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

製造販売元 株式会社 雪の元本店

奈良県橿原市大谷町182番地