

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ裏面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

おしっこ[®]の悩みに **ユリナール[®]顆粒**

販売名:ユリナール (清心蓮子飲エキス製剤)

漢方製剤 **第2類医薬品**

製品特徴

頻尿

目安として、昼間8回以上、
夜2回以上トイレに行く

残尿感

出した後、残る感じがして
スッキリしない

出しぶり

尿のキレが悪い
構えてもすぐに出ない
勢いが弱く、とぎれとぎれに出る

セイシレンシニン

ユリナールは、漢方処方「清心蓮子飲」に基づく製剤です

9種類の生薬からなる漢方処方が、頻尿や残尿感などの症状を徐々に緩和します
胃腸が弱く、全身に倦怠感があり、普段から口や舌が乾燥気味で、
尿が出しぶりがちな方に適しています

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・ 息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、 これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる

- 1ヶ月くらい服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症：頻尿、残尿感、排尿痛、排尿困難、尿のにごり、こしけ(おりもの)

用法・用量

次の量を食前または食間に水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守すること

(2)吸湿しやすいため、1回で服用すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量

1日量(3包:5.4g)中

清心蓮子飲乾燥エキス-A・・・4.060g

<原生薬換算量>

レンニク・・・・・・・・・・3.5g	バクモンドウ・・・・・・・・2.1g
ブクリョウ・・・・・・・・2.8g	ニンジン・・・・・・・・・・3.5g
シャゼンシ・・・・・・・・2.1g	オウゴン・・・・・・・・・・2.1g
オウギ・・・・・・・・・・2.8g	ジコッピ・・・・・・・・・・2.1g
カンゾウ・・・・・・・・・・0.7g	

添加物として、デヒドロ酢酸Na、ケイ酸Al、D-マンニトール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、香料を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること

(2)小児の手の届かないところに保管すること

(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします



発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎ 06(6203)3625
受付時間9:00～17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元

株式会社パナケイア製薬

〒939-1275 富山県高岡市中田4576番地

10118653 MADE IN JAPAN

7BE-12HS