

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるように大切に保管してください。



くしゃみ、鼻水、鼻づまりに
持続性

ガノン[®]鼻炎L

第2類医薬品

(鼻炎用薬)

アレルギー性鼻炎は、発作性、反復性のくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの不快な症状を引き起こします。ハウスダスト、花粉、ペットなどの原因が明らかな場合には、その原因（抗原）を除去、減量することが大切です。ガノン[®]鼻炎Lは、アレルギー性鼻炎などによるくしゃみ、鼻水、なみだ目などの症状に優れた効果を発揮します。また、ガノン[®]鼻炎Lは、すぐに溶けて効果をあらわす顆粒と、一定の時間がたってから効果をあらわす顆粒を組み合わせていますので、効果が持続し1日2回朝夕の服用で症状の改善をはかることができます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

※(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)次の症状のある人。

前立腺肥大による排尿困難

(3)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)授乳中の人。

(4)高齢者。

(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6)かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。

(7)次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(8)次の診断を受けた人。

緑内障、腎臓病

(9)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
※ 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわぎ、眠気、便秘、目のかすみ
- 5～6日間服用しても症状がよくなるしない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

【用法・用量】

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	2回朝夕
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満	服用しないでください。	



（用法・用量に関連する注意）

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- カプセルの取り出し方
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。
（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）




※【成分・分量・はたらき】

成 分	4カプセル (1日量)の分量	主なはたらき
クロルフェニラミン マレイン酸塩	8mg	アレルギー症状（鼻水、くしゃみ）を改善します。
ブソイドエフェドリン 塩酸塩	120mg	鼻粘膜の充血や腫脹（はれ）をおさえ、鼻づまりを改善します。
ベラドンナ 総アルカロイド	0.4mg	鼻水やなみだが過剰に出るのを改善します。
無水カフェイン	100mg	頭重（頭が重い感じ）をやわらげ、ねむけをおさえます。

添加物としてゼラチン、タルク、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸Na、CMC-Ca、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、セルロース、青色1号を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



【包 装】

18カプセル、24カプセル

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。
天野商事株式会社 お客様相談室
電話：(052) 951-2340
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日及び弊社休業日を除く）



発売元

天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号



製造販売元

アスゲン製薬株式会社
岐阜県瑞浪市山田町字小洞 2008