

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

医薬品

そ けい かっ けつ とう 疎経活血湯エキス顆粒OM

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感
 - (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

《効能又は効果》

関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

《用法及び用量》

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成 人 (15歳以上)	1包	
15歳未満 7歳以上	2/3包	3回
7歳未満 4歳以上	1/2包	
4歳未満	服用しないこと	

《用法・用量に関する注意》

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(裏面もお読みください)

《成分及び分量》

疎経活血湯エキス顆粒OMの1日量〔3包（1包 2.0g）〕中には、下記生薬より得た疎経活血湯エキス3500mgを含む。

トウキ	1.0 g	シャクヤク	1.25 g	リュウタン	0.75 g
ジオウ	1.0 g	ゴシツ	0.75 g	ショウキョウ	0.25 g
センキュウ	1.0 g	イレイセン	0.75 g	チンピ	0.75 g
ビヤクジュツ	1.0 g	ボウイ	0.75 g	ビヤクシ	0.5 g
ブクリョウ	1.0 g	キヨウカツ	0.75 g	カンゾウ	0.5 g
トウニン	1.0 g	ボウフウ	0.75 g		

添加物として、塩酸グルコサミン、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、二酸化ケイ素を含有する。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」

〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

電話 (0745) 22-3601(代)

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574