

第2類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

漢方薬

そ けい かつ けつ とう
疎経活血湯エキス顆粒OM

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

《効能又は効果》
関節痛、神経痛又は筋肉痛

《用法及び用量》

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3 回
15歳未満 7歳以上	2/3包	
7歳未満 4歳以上	1/2包	
4歳未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

《成分及び分量》

疎経活血湯エキス顆粒OMの1日量〔3包(1包2.0g)〕中には、下記生薬より抽出した疎経活血湯エキス3500mgを含む。

トウキ	1.0g	ボウイ	0.75g
ジオウ	1.0g	キヨウカツ	0.75g
センキュウ	1.0g	ボウフウ	0.75g
ビャクジユツ	1.0g	リュウタン	0.75g
ブクリヨウ	1.0g	ショウキヨウ	0.25g
トウニン	1.0g	チンピ	0.75g
シャクヤク	1.25g	ビャクシ	0.5g
ゴシツ	0.75g	カンゾウ	0.5g
イレイセン	0.75g		

添加物として、塩酸グルコサミン、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロビレン glycole、二酸化ケイ素を含有する。

《保管及び取り扱い上の注意》

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」

〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

電話 (0745) 22-3601(代)

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574