

新生ストB

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	かぜ薬(内用)
承認販売名	新生ストB
製品名	新生ストB
製品名(読み)	シンセイストB
製品の特徴	<p>かぜの諸症状には、発熱・悪寒・頭痛・鼻水・鼻づまり・くしゃみ・のどの痛み・せき・たん・関節の痛み・筋肉の痛みなどがあります。新生ストBは、これらの症状に有効な各種の成分を配合した総合かぜ薬です。非ピリン系解熱鎮痛剤、鎮咳剤、気管支拡張剤、抗ヒスタミン剤などを配合し、かぜの諸症状の緩和にすぐれた効果をあらわします。</p> <p>特長</p> <ul style="list-style-type: none"> ●すぐれた解熱・鎮痛作用 ●不快な鼻水・鼻づまりの緩和に効果 ●せきを止める作用がすぐれている
使用上の注意	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用しないこと <ol style="list-style-type: none"> (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気があらわれることがある。) 4. 服用時は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること <ol style="list-style-type: none"> (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)授乳中の人。 (4)高齢者。 (5)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (7)次の症状のある人。 高熱、排尿困難 (8)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること <ol style="list-style-type: none"> (1)服用後、次の症状があらわれた場合 <p>[関係部位：症状] 皮ふ：発疹・発赤、かゆみ 消化器：悪心・嘔吐、食欲不振</p>

	<p>精神神経系: めまい その他: 排尿困難</p> <p>まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。</p> <p>[症状の名称: 症状] ショック(アナフィラキシー): 服用後すぐにじんましん, 浮腫, 胸苦しさ等とともに, 顔色が青白くなり, 手足が冷たくなり, 冷や汗, 息苦しさ等があらわれる。 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群): 高熱を伴って, 発疹・発赤, 火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が, 全身の皮ふ, 口や目の粘膜にあらわれる。 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群): 高熱を伴って, 発疹・発赤, 火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が, 全身の皮ふ, 口や目の粘膜にあらわれる。 肝機能障害: 全身のだるさ, 黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。 間質性肺炎: 空せき(たんを伴わないせき)を伴い, 息切れ, 呼吸困難, 発熱等があらわれる。(これらの症状は, かぜの諸症状と区別が難しいこともあり, 空せき, 発熱等の症状が悪化した場合にも, 服用を中止するとともに, 医師の診療を受けること。) ぜんそく 呼吸抑制: 息切れ, 息苦しさなどがあらわれる。</p> <p>(2)5~6回服用しても症状がよくなる場合 3. 次の症状があらわれることがあるので, このような症状の継続又は増強が見られた場合には, 服用を中止し, 医師又は薬剤師に相談すること 口のかわき</p>												
<p>効能・効果</p>	<p>かぜの諸症状(鼻水, 鼻づまり, くしゃみ, のどの痛み, せき, たん, 悪寒, 発熱, 頭痛, 関節の痛み, 筋肉の痛み)の緩和</p>												
<p>効能関連注意</p>													
<p>用法・用量</p>	<p>食後なるべく30分以内に服用してください。</p> <p>[年齢: 1回量: 1日服用回数] 成人(15才以上): 2錠: 3回 7才以上15才未満: 1錠: 3回 7才未満: 服用させないでください。</p>												
<p>用法関連注意</p>	<p>(1)用法及び用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに服用させてください (3)12才未満の小児には, 医師の診療を受けさせることを優先してください。</p>												
<p>成分分量</p>	<p>6錠中</p> <table border="1" data-bbox="611 1704 1050 1939"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>900mg</td> </tr> <tr> <td>リン酸ジヒドロコデイン</td> <td>16mg</td> </tr> <tr> <td>マレイン酸クロルフェニラミン</td> <td>7.2mg</td> </tr> <tr> <td>dl-塩酸メチルエフェドリン</td> <td>60mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>75mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	900mg	リン酸ジヒドロコデイン	16mg	マレイン酸クロルフェニラミン	7.2mg	dl-塩酸メチルエフェドリン	60mg	無水カフェイン	75mg
成分	分量												
アセトアミノフェン	900mg												
リン酸ジヒドロコデイン	16mg												
マレイン酸クロルフェニラミン	7.2mg												
dl-塩酸メチルエフェドリン	60mg												
無水カフェイン	75mg												
<p>添加物</p>	<p>セルロース, ヒドロキシプロピルセルロース, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム, ステアリン酸マグネシウム, 白糖, タルク, 炭酸カルシウム, アラビアゴム, ゼラチン, マクロゴール, ヒプロメロース(ヒドロキシプロピルメ</p>												

	チルセルロース), カルメロースナトリウム(CMC-Na), カルナウバロウ, サラシミツロウ, 酸化チタン, 赤色3号, 黄色5号
保管及び取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。 (2)小児の手のとどかない所に保管すること。 (3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。) (4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。
消費者相談窓口	会社名:常盤薬品工業株式会社 問い合わせ先:お客さま相談室 電話:0120-875-710 受付時間:9:00~17:00(土, 日, 祝日を除く) その他:www.kusuribako.jp
製造販売会社	常盤薬品工業(株) 会社名:常盤薬品工業株式会社 住所:大阪市中央区安土町3-5-12
販売会社	
剤形	錠剤
リスク区分等	第「2」類医薬品