

ストップチン

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	鎮咳去痰薬
承認販売名	
製品名	ストップチン
製品名(読み)	ストップチン
製品の特徴	<p>「せき」は、異物や分泌物を体外に排出して、身体を守ろうとする生体にとって有益な反射運動です。しかし、せきがはげしくなると体力の消耗を招いたり、安静や睡眠が妨げられたりして、病気の回復を遅らせることとなります。</p> <p>ストップチンは、せきの中枢に働いて、せきをしずめるジヒドロコデインリン酸塩と気管支をひろげるdl-メチルエフェドリン塩酸塩を配合していますので、せきとたんにも効果をあらわします。</p> <p>特長</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●せきに効果のある鎮咳剤ジヒドロコデインリン酸塩を配合</li> <li>●配合成分がせきの中枢と気管支の両方に作用し、せきとたんにも効果をあらわす</li> </ul>
使用上の注意	<p><b>■してはいけないこと</b> (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮痛剤、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)</li> <li>2. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください(眠気などがあらわれることがあります。)</li> <li>3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください</li> <li>4. 過量服用・長期連用しないでください</li> </ol> <p><b>■相談すること</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 医師の治療を受けている人。</li> <li>(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。</li> <li>(3) 高齢者。</li> <li>(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>(5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難</li> <li>(6) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</li> </ol> </li> <li>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください</li> </ol> <p>[関係部位：症状]              皮ふ：発疹・発赤、かゆみ              消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振              精神神経系：めまい              泌尿器：排尿困難</p>

	<p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <p>[症状の名称:症状]  再生不良性貧血:青あざ, 鼻血, 歯ぐきの出血, 発熱, 皮ふや粘膜が青白く見える, 疲労感, 動悸, 息切れ, 気分が悪くなりくらくとする, 血尿などがあらわれる。  無顆粒球症:突然の高熱, さむけ, のどの痛みなどがあらわれる。  呼吸抑制:息切れ, 息苦しさなどがあらわれる。</p> <p>3. 服用後, 次の症状があらわれることがあるので, このような症状の持続または増強がみられた場合には, 服用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師または登録販売者に相談してください  便秘, 口のかわき, 眠気</p> <p>4. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し, この文書を持って医師, 薬剤師または登録販売者に相談してください</p>										
効能・効果	せき, たん										
効能関連注意											
用法・用量	<p>1日3回毎食後に服用してください。</p> <p>[年齢:1回量:1日服用回数]  成人(15才以上):1包:3回  11才以上15才未満:2/3包:3回  8才以上11才未満:1/2包:3回  5才以上8才未満:1/3包:3回  3才以上5才未満:1/4包:3回  3才未満:服用しないでください。</p>										
用法関連注意	<p>(1)用法・用量を厳守してください。  (2)小児に服用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに服用させてください。  (3)12才未満の小児には, 医師の診療を受けさせることを優先してください。</p>										
成分分量	<p>3包(3g)中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>30mg</td> </tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>75mg</td> </tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>12mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>150mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	無水カフェイン	150mg
成分	分量										
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg										
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg										
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg										
無水カフェイン	150mg										
添加物	乳糖, バレイシヨデンブン, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース										
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  (2)小児の手のとどかない所に保管してください。  (3)他の容器に入れかえないでください。  (誤用の原因になったり品質が変わります。)  (4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。</p>										
消費者相談窓口	<p>問い合わせは  常盤薬品工業株式会社  お客様相談室0120-875-710まで  受付時間9:00~17:00(土, 日, 祝日を除く)</p>										
製造販売会社	<p>常盤薬品工業(株)  会社名:常盤薬品工業株式会社  住所:大阪市中央区安土町3-5-12</p>										

販売会社	
剤形	散剤
リスク区分等	第「2」類医薬品