

第2類医薬品

使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要などきに読めるように、大切に保管してください。

トピーホ軟膏（外用鎮痛消炎薬）

トピーホ軟膏は、非ステロイド系抗炎症剤インドメタシンを主成分に、さわやかな清涼感を与えるl-メントールを配合した外用鎮痛消炎薬です。


本品は独自の技術により、サツとのび、有効成分が皮ふに浸透しやすいゲルタイプに仕上げましたので、痛みのある部分に直接吸収され、痛みや炎症をやわらげます。腰痛、関節痛、筋肉痛をはじめ打撲、捻挫（ねんざ）などに効果をあらわします。

特長


- インドメタシンが主薬
 - スーッとさわやかな使い心地
 - 関節や筋肉での炎症を直接おさえる
 - 皮ふに浸透しやすいゲルタイプ
- こんな痛みによく効きます。



腰痛



関節の痛み



肩こりに伴う肩の痛み

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜など。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等または化膿している患部。
3. 長期連用しないでください



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

腰痛、関節痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

1日4回を限度として、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)11才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)11才未満の小児に使用させないでください。
- (4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (7)皮ふが敏感な人は、腕の内側などの柔らかいところに少量つけて、異常がないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 本品100g 中

成分	分量	はたらき
インドメタシン	0.75g	痛みやはれの部位に直接作用する鎮痛・消炎剤です。
l-メントール	3g	清涼感を与えて、痛みをやわらげます。

添加物：BHT、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、ジイソプロパノールアミン、ベンジルアルコール、イソプロパノール、パラベン

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 ☎0120-875-710まで
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
www.kusuribako.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931

製造販売元
常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP