

服用に際し、表示事項を必ず読むこと。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないこと。

⚠️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。1) 医師の治療を受けている人。2) 高齢者。3) 次の症状のある人。むくみ。4) 次の診断を受けた人。高血圧、腎臓病、心臓病。2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。
- 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

第2類医薬品

6種の生薬

胆汁エキス

塩化カルニチン

30mL

胃腸内服液

ガロール健芯液

飲み過ぎ 食べ過ぎ 胸やけ

効能効果 食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐。

成分分量 1本(30mL)中
胆汁エキス………33.3mg
カッコー抽出液……2.67mL
(原生薬として266.7mg)
ニンジンエキス……54.1mg
(原生薬として600mg)
カンゾウエキス……125mg
(原生薬として500mg)
ビャクジュツエキス……90.9mg
(原生薬として500mg)
ケイヒ流エキス……0.67mL
(原生薬として666.7mg)
ショウキョウ流エキス……0.2mL
(原生薬として200mg)
塩化カルニチン……100mg

添加物:白糖、ポリオキシエチレン硬化マシ油、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、香料。


4987926
125559

用法用量 次の1回量を1日3回を限度として服用する。ただし、服用間隔は4時間以上おくこと。

年齢	1回量
成人(15才以上)	1本
15才未満	服用しないこと

ガラス:ビン 金属:キャップ

製造販売元

 日水製薬医薬品販売株式会社
東京都台東区上野1-18-11
電話: 03-3837-0987

製造番号◆使用期限(年,月) TS1804