

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

痔の痛み、かゆみ、はれ、出血に

ヘモスカット軟膏

外用痔疾用薬

ヘモスカット軟膏は…

- ・痔の炎症やはれに優れた効果をあらわすヒドロコルチゾン酢酸エステルを配合しています。
- ・つらい痛みを抑える局所麻酔薬のジブカイン塩酸塩、細菌感染を防ぐクロルヘキシジン塩酸塩、傷ついた組織を修復するアラントインなどを配合しておりつらい症状に早く効きます。
- ・皮膚への刺激が少ない軟膏剤ですので、敏感な方でもご使用になれます。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。



2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

《効能・効果》

きれ痔(さげ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

《用法・用量》

1日3回、適量を肛門部に塗布してください。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 肛門部にのみ使用すること。


《成分・分量と作用》 本品100g中

成分	分量	主な働き
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.20g	炎症をおさえ、はれ・かゆみを鎮めます。
ジブカイン塩酸塩	0.30g	痛み、かゆみを抑えます。
フェニレフリン塩酸塩	0.15g	患部の出血を抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.50g	かゆみをしずめます。
クロルヘキシジン塩酸塩	0.20g	細菌の感染をおさえ、患部の悪化を防ぎます。
トコフェロール酢酸エステル	1.00g	血行を改善し、うっ血を防ぎます。
アラントイン	0.80g	患部の組織を修復し、治りをはやめます。

(添加物として、サラシミツロウ、スクワラン、流動パラフィン、ワセリンを含有する。)

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)



《治療のアドバイス》

- 硬い便は肛門に傷をつけたり、出血や脱肛の原因となりますから、食事に注意し、便秘にならないように心がけてください。
- ぬれたガーゼで拭く、こまめに入浴をするなど、患部を常に清潔に保つように心がけてください。
- 座る、かがむなど患部にうっ血を起しやすい姿勢を長く続けしないでください。
- お酒や香辛料の入った食べ物、タバコなどはなるべくさけるようにしてください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
株式会社 雪の元本店 お客様相談室
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土曜、日曜、祝日を除く)
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

製造販売元 株式会社 **雪の元本店**
奈良県橿原市大谷町182番地