

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 鎮咳去痰薬 せき・たんに効く

第②類医薬品

# JAクミアイせき止め錠

JAクミアイせき止め錠は中枢性の鎮咳作用を有するジヒドロコデインリン酸塩を主成分とし、さらに気管支拡張作用のあるdl-メチルエフェドリン塩酸塩、抗ヒスタミン剤クロルフェニラミンマレイン酸塩、去痰作用のあるグアヤコールスルホン酸カリウム及びキキョウ乾燥エキス末等を配合しており、せき、たんに効果があります。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(眠気等があらわれることがある。)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 過量服用・長期連用しないこと

#### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効 能

せき、たん

**用法・用量** 次の量を、水又はぬるま湯で食後服用してください。

年 齢	1 回 量	服 用 回 数
成人(15才以上)	4錠	1日3回
8才～14才	2錠	
5才～7才	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量 12錠中

成 分 名	分 量	作 用
ジヒドロコデイン リン酸塩	30mg	せき中枢に作用して、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン 塩酸塩	75mg	気管支をひろげ、たんを出しやすくします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン剤。アレルギー性のせきに効果があります。
グアヤコール スルホン酸カリウム	270mg	たんを切れやすくします。
無水カフェイン	90mg	眠気を防ぎます。
キキョウ乾燥エキス末	120mg (キキョウ 600mgに相当)	サポニン系の去痰生薬です。気道の分泌物を増加させるとともに、繊毛運動を活発にしていたんの排出を助けます。

添加物：ケイ酸Al、乳糖水和物、セルロース、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、ゼラチン、アラビアゴム、酸化チタン、リン酸水素Ca水和物、タルク、炭酸Ca、白糖、カルナウバロウ、黄色5号

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)配置期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤に付着しますと、表面の糖衣の一部が溶けて斑点を生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手でふれないでください。
- (6)ピンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いてください。これをピンに出し入れますと、異物混入の原因になることがあります。



製品についてのお問い合わせは、お買い求め先又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話：058-278-3933  
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の  
お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

本社所在地

## 小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鞆1丁目139番地  
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号