

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

スプレー式鎮痛消炎剤

第2類医薬品

筋肉・関節のつらい痛み

**エアースロンパス<sup>®</sup> DX** 微香性  
フェルビナク3.0%配合

優れた抗炎症、鎮痛効果が認められている成分「フェルビナク」3.0%と血液の循環をよくする成分「 $\alpha$ -トメントール」3.0%を配合した鎮痛消炎スプレー剤です。関節痛・筋肉痛、打撲、捻挫などの患部にスプレーする事で、冷却効果に加え有効成分「フェルビナク」が皮膚から吸収されて、つらい痛みをとり除きます。

### △使用上の注意

#### ⊗してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

#### 1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

#### 2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) 化膿している患部。



#### ■相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー（例えば発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれなど）を起こしたことがある人。

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

- (2) 1週間くらい使用しても症状がよくなる場合。

### 効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）


### 用法・用量

1日2～4回、適量を患部に噴霧又は塗布してください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の

診療を受けてください。(2)顔に向けて噴射しないでください。(3)肩・首などに使用する場合は手にとって塗布してください。(4)ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。(5)外用にのみ使用し、吸入しないでください。また周囲の人にも十分注意してください。(吸入によりめまい、はき気、せき、鼻やのどへの刺激等の症状を起すことがあります。)(6)よく振って、必ずノズルを下に向けて使用してください(上向き、横向きに使用するとガスだけが出て、薬液が残り、最後まで使用できなくなったり、薬液が飛び散ったりすることがあります。)(7)患部まで約10cmの距離で噴射してください。また、同じ箇所連続して3秒以上噴霧しないでください。(8)用法・用量を守ってください。



## 成分・分量

成分含量(原液100g中)※  
 フェルピナク...3g、*l*-メントール...3g 添加物として、エタノール、トリエタノールアミン、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、DMEを含有します。

※本品1本あたりの成分の含量は缶に表示してあります。

## 保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)火気に近づけないでください。使用済みの容器は火中に投じないでください。(4)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になりたり品質が変わることがあります。)(5)捨てる時には、〈ガス抜き〉の注意事項をよくお読みください(残ガス排出機構付き)。(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

## 廃棄の際のガス抜きの注意事項と方法

### 〈ガス抜きの注意事項〉

- ・必ず中身を使い切ってから、火気のない風通しのよい屋外で行ってください。
- ・ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。
- ・本品のキャップ以外は使用しないでください。
- ・噴射されるガスを直接吸い込まないよう注意してください。

### 〈ガス抜きの方法〉

※下図は商品の説明書です。サンプル品は構造が異なります。

①「PUSH」マークを押すとボタンと肩カバーが別れます。

②押しボタンを引き抜きます。

③キャップの上部をはずし、平らな所に伏せて置きます。

④キャップの天面中央の穴に本体を逆さまにして押し込み、噴射音が消えるまで放置します。



⑤噴射音が完全に消えてから、市町村等で定められた方法により破棄してください。

本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店、又は下記の当社「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00,13:00～17:50(土、日、祝日を除く)

