

MACH II TABLETS

かぜぐすり

マッハII

TRADE MARK



第②類医薬品

発売 仁生薬品株式会社
富山県滑川市堀江636

®

かぜぐすり マツハ Ⅱ

第②類医薬品

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

15才以上（大人）……………1回2錠
7才以上15才未満……………1回1錠
1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

成分・分量 1日量(6錠)中

アセトアミノフェン……………900mg
クロペラスチン塩酸塩……………48mg
無水カフェイン……………75mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………7.5mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルクを含有します。その他の添加物成分は、添付文書をご覧ください。

製造販売元

6錠 ￥450.+税

注意 (非ピリン系)

1. 次の人は服用しないでください。
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
3. 服用に際しては、添付文書をよくお読みください。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
5. 小児の手の届かない所に保管してください。
6. 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

中新薬業株式会社
富山県滑川市上小泉504-2



品目番号 78-492

配置期限

かぜ薬(錠剤用)

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気があらわれることがあります)
4. 服用時は飲酒しないで下さい。
5. 長期連用しないで下さい。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
 - (4) 高齢者
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (7) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振	そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること)
ぜ ん そ く	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上(大人)	2錠	3回
7才以上15才未満	1錠	
7才未満	服用しないこと	

食後なるべく30分以内に服用して下さい。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 1日量(6錠)中

アセトアミノフェン……………900mg クロルフェニラミンマレイン酸塩…7.5mg
 クロペラスチン塩酸塩……………48mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩…60mg
 無水カフェイン……………75mg

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、セルロース、メチルセルロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 営業部 電話 (076)475-2121 受付時間 8:10~16:40(土、日、祝日を除く)



製造販売元 **中新薬業株式会社** 富山県滑川市上小泉504-2