

使用に際しては、説明書きをよくお読みください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合
は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】●のどの炎症による声がれ・のどのあれ・
のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
●口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去


【用法・用量】次の1回量を、口中に含み、かまずにゆっ
くり溶かしてください。

年 齢	1回量	1日使用回数
15歳以上	1錠	4～6回
5歳以上15歳未満		2～3回
5歳未満		使用しないでください

【用法及び用量に関連する注意】

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 小児に使用させる場合
には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 本剤
はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでく
ださい。(4) 本剤は5歳未満の乳幼児には使用させないでくだ
さい。(5) トローチ剤の取り出し方

右図のようにトローチ剤の入っている
PTPシート凸部を指先で強く押して裏側
のアルミ箔を破り、取り出してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食
道粘膜に突き刺さるなどの思わぬ事故
につながります。)



【成分・分量】1錠(1.2g)中に次の成分を含有しています。

アズレンスルホン酸ナトリウム……………0.8mg
グリチルリチン酸二カルシウム……………2.5mg
セチルピリジニウム塩化物水和物 …… 1mg

添加物：精製白糖、粉末還元麦芽糖水アメ、ポビドン、マクロゴール
6000、炭酸水素ナトリウム、l-メントール、ステアリン酸カル
シウム、安息香酸ベンジル、プロピレングリコール、香料

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してくだ
さい。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の
容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が
変わることがあります。)(4) アルミ袋を開封し、日数を経ると、光
や熱、湿気により変色することがあります。ご使用の残りは保管方
法に注意し、変色したものは使用しないでください。(5) 使用期限
を過ぎた製品は使用しないでください。(6) 本剤に添加されてい
るl-メントールが、温度変化等により綿状又は繊維状に析出する
場合がありますが、品質には問題ありません。