

頻尿・残尿感改善薬

レディガードコーワ

レディガードコーワは、有効成分フラボキサート塩酸塩をOTC医薬品として開発した頻尿・残尿感の改善薬です。

日中に何度も何度もトイレに行きたくなくなったり、就寝後に排尿のために起きてしまったりする「頻尿」や、トイレに行ってもすっきりした感じがしない「残尿感」は、尿をためる膀胱の感覚が過敏となることなどで起こります。レディガードコーワは、膀胱機能を調整し、過敏な状態を正常な状態に改善しますので、頻尿や残尿感といった尿トラブルにすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 男性 (男性は前立腺肥大症による症状の可能性があり、本剤を服用すると尿が出にくくなる恐れがある)。
- (2) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。
- (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (妊娠中の服用については、安全性が十分に確認されていない)。
- (5) 医療機関にて幽門、十二指腸及び腸管の閉塞の診断を受けた人。
- (6) 次の症状等がある人 (何らかの重篤な疾患等による症状の可能性があるので、泌尿器科の専門医を受診すること)。
 - ・脳脊髄疾患 (脳腫瘍、脳梗塞や脳出血等の脳血管障害、パーキンソン病、脊髄損傷、脊椎腫瘍等) の診断を受けた人
 - ・子宮癌又は直腸癌等の骨盤内手術を受けた人
 - ・血尿、排尿痛、膀胱痛、尿失禁の症状のある人
 - ・日中の頻尿がなく、就寝後のみ頻尿のある人
 - ・発症が急性 (発症後1ヵ月以内) の人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと

(1ヵ月以上服用する場合、医師又は薬剤師に相談して服用すること。)

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 授乳中の人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の診断を受けた人。
 - 心臓病、緑内障、肝臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、食欲不振、悪心・嘔吐、胃痛、腹痛、胸やけ
精神神経系	頭痛、めまい、頭部のふらふら感、しびれ感、不眠
その他	下腹部膨満感、ほてり、異常なまぶしさ、つかれ目、排尿困難、尿閉、動悸、胸部不快感、咽頭部違和感、かれ声

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸 (皮ふや白目が黄色くなる) 等があらわれる。

(2) 1週間服用しても症状がよくならない場合 (他に何らかの疾患があることによる症状の可能性があるので、泌尿器科の専門医を受診すること)

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

口のかわき、便秘、下痢

効能・効果

女性における頻尿（排尿の回数が多い）、残尿感

用法・用量

下記の量を服用すること。服用間隔は4時間以上おくこと。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人女性（15歳以上）	1錠	3回
成人男性（15歳以上）	服用しないこと	
15歳未満の小児		

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)錠剤の取り出し方：

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。）



成分・分量（3錠中）

成分・分量	働 き
フラボキサート塩酸塩 600mg	膀胱機能を調整して、頻尿や残尿感を改善します。

[添加物] トウモロコシデンプン、カルメロース、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、プロピレングリコール、カルナウバロウ、三二酸化鉄

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)PTPのアルミ箔が破れたり、中身の錠剤が破損しないように、保管及び携帯に注意すること。
- (5)使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
 興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
 TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
 電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



Kowa 製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14