

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	かぜ薬(内用)
承認販売名	新カドリンカプセルG
製品名	新カドリンカプセルG
製品名(読み)	シンカドリンカプセルG
製品の特徴	
使用上の注意	<p>■してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用しないでください <ol style="list-style-type: none"> (1)本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。) 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 5. 服用前後は飲酒しないでください 6. 長期連用しないでください <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください <ol style="list-style-type: none"> (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。 高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください <p>[関係部位:症状] 皮膚:発疹・発赤、かゆみ 消化器:吐き気・嘔吐、食欲不振 精神神経系:めまい 泌尿器:排尿困難 その他:過度の体温低下</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <p>[症状の名称:症状] ショック(アナフィラキシー):服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群):中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症:高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 肝機能障害:発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 腎障害:発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。 間質性肺炎:階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 ぜんそく:息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 再生不良性貧血:青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 無顆粒球症:突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 呼吸抑制:息切れ、息苦しさ等があらわれる。</p> <p>3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場</p>

	<p>合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、口のかわき、眠気 4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>																
効能・効果	かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和																
効能関連注意																	
用法・用量	<p>次の量を、食後なるべく30分以内に水又は白湯にて服用してください。 [年齢:1回量:1日服用回数] 成人(15歳以上):2カプセル:3回 7歳以上15歳未満:1カプセル:3回 7歳未満:服用しないでください</p>																
用法関連注意	<p>(1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (3)12歳未満の小兒には、医師の診療を受けさせることを優先してください。 (4)カプセルの取り出し方 右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)</p>																
成分分量	<p>1日量(6カプセル)中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th><th>分量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td><td>900mg</td></tr> <tr> <td>クロルフェニラミンマレイン酸塩</td><td>7.5mg</td></tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td><td>24mg</td></tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td><td>60mg</td></tr> <tr> <td>無水カフェイン</td><td>75mg</td></tr> <tr> <td>ゴオウ末</td><td>3mg</td></tr> <tr> <td>リゾチーム塩酸塩</td><td>60mg(力価)</td></tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	900mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	無水カフェイン	75mg	ゴオウ末	3mg	リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)
成分	分量																
アセトアミノフェン	900mg																
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg																
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg																
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg																
無水カフェイン	75mg																
ゴオウ末	3mg																
リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)																
添加物	トウモロコシデンプン、乳糖水和物、カルメロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Na、亜硫酸水素Na、酸化チタン																
保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手のとどかない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります) (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。</p>																
消費者相談窓口	<p>会社名:株式会社廣貫堂 問い合わせ先:お客様相談窓口 電話番号:076-424-2259 受付時間:9時から17時まで(土・日・祝祭日を除く)</p>																
製造販売会社	<p>(株)廣貫堂 添付文書情報 会社名:株式会社廣貫堂 住所:富山市梅沢町2丁目9-1</p>																
販売会社																	
剤形	カプセル																
リスク区分等	第「2」類医薬品																