販売名:アンミナイト 第2類医薬品

この外箱は，お薬とともに保管し，ご使用の際にはよくお読みください。

⚠使用上の注意

してはいけないこと ⊠

（守らないと現在の症状が悪化したり，副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと
   (1)妊婦又は妊娠していると思われる人。
   (2)15才未満の小児。
   (3)日常的に不眠の人。
   (4)不眠症の診断を受けた人。
2. 本剤を服用している間は，次のいずれの医薬品も使用しないこと
   他の催眠鎮静薬，かぜ薬，解熱鎮痛薬，鎮咳去痰薬，抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬，乗物酔い薬，アレルギー用薬等）
3. 服用後，乗物又は機械類の運転操作をしないこと
   （眠気をもよおして事故を起こすことがある。また，本剤の服用により，翌日まで眠気が続いたり，だるさを感じる場合は，これらの症状が消えるまで，乗物又は機械類の運転操作をしないこと。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか，本剤を服用する場合は授乳を避けること
5. 服用前後は飲酒しないこと
6. 寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ，連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
   (1)医師の治療を受けている人。
   (2)高齢者。（高齢者では眠気が強くあらわれたり,また反対に神経が高ぶるなどの症状があらわれることがある。）
   (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
   (4)次の症状のある人。排尿困難
   (5)次の診断を受けた人。緑内障，前立腺肥大
2. 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この外箱を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤，かゆみ
消化器	胃痛，吐き気・嘔吐，食欲不振
精神神経系	めまい，頭痛，起床時の頭重感，昼間の眠気，気分不快，神経過敏，一時的な意識障害（注意力の低下，ねぼけ様症状，判断力の低下，言動の異常等）
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	倦怠感

3. 服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続又は増強が見られた場合には，服用を中止し，この外箱を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
   口のかわき，下痢
4. 2～3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し，この外箱を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

翌日まで眠気が続いたり，だるさを感じることがある。

〔効能・効果〕 一時的な不眠の次の症状の緩和：寝つきが悪い，眠りが浅い

〔用法・用量〕 寝つきが悪い時や眠りが浅い時，次の量を1日1回就寝前に服用する。

年　齢	1回量
成人（15才以上）	1瓶（30mL）
15才未満	服用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉
(1)用法・用量を厳守すること。
(2)1回1瓶（30mL）を超えて服用すると，神経が高ぶるなど不快な症状があらわれ，逆に眠れなくなることがある。
(3)就寝前以外は服用しないこと。

第2類医薬品

ゼリア新薬

ヒツジの数が・・・

寝つきが悪い 眠りが浅い

一時的な不眠による このような症状の緩和

睡眠改善薬

アンミナイト®

ドリンクタイプ 30mL

〔成　分〕 1日量（1瓶30mL）中
ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg　添加物：エリスリトール，スクラロース，カラメル，安息香酸Na，クエン酸Na，香料，エタノール，バニリン，D-ソルビトール，pH調節剤2成分，その他1成分

〔保管及び取扱い上の注意〕
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手のとどかない所に保管すること。
(3)他の容器に入れかえないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

4 987103 045069

品名コード 5937

製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11
お客様相談室☎03-3661-2080
受付　9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

副作用被害救済制度 0120-149-931

製造番号

使用期限 [年.月]

アンミナイトはゼリア新薬工業（株）の登録商標です。