

経皮鎮痛消炎剤

8枚入(7×10cm)

ボルタレン[®] AC

テープ


Voltaren[®] AC



有効成分

ジクロフェナクナトリウム配合

第1類医薬品



肩、腰に
一日一回で効く!
痛みに、ズバリ。

腰痛、肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎、打撲、捻挫

たて・よこ
伸縮自在

NOVARTIS

ご使用に際しては、この外箱の説明文書をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

開封口

テープ

8枚入

- 特徴
- 有効成分ジクロフェナクナトリウムを配合した鎮痛消炎テープ剤で、優れた経皮吸収性があります。
 - 有効成分が徐々に放出され、優れた持続性があります。1日1回使用。
 - 有効成分が外部に揮散せず、痛みのもとを狙って作用します。
 - 貼った部分からじんわり心地よい清涼感が広がります。
 - 貼りやすい、たて・よこ伸縮自在のテープ剤です。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1.次の人は使用しないでください。

(1)目周囲、粘膜等 (2)湿疹・かぶれ、傷口 (3)みずむし・たむし等又は化膿している部位

3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。

4.連続して2週間以上使用しないでください。

(1)目的周囲、粘膜等 (2)湿疹・かぶれ、傷口 (3)みずむし・たむし等又は化膿している部位

3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。

4.連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人 (2)他の医薬品を使用している人 (3)本人又は家族がアレルギー体質の人 (4)薬によりアレルギー症状を起したことがある人 (5)テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人 (6)次の診断を受けた人 消化性潰瘍、肝臓疾患、肝臓病、腎臓病、高血圧、心筋梗塞、インフルエンザ (7)次の医薬品の投与を受けている人 ニューキーリン系抗酸剤、トリアルミテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド系抗炎症剤(アスピリン等)、スルフォドリゾン剤、シクロスルボン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (8)高齢者

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ・かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮ふのある、落屑(くせつ)(フカ・アカのよう皮ふのはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名前	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、舌itis、動悸、意識の混迷等があらわれます。
接触皮炎、光過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱などがあらわれ、中央には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることがあります。また、日光があたった部位に斑状(はんじょう)や悪化することがあります。

(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回1~2枚を患部に貼ってください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

<用法・用量に関する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)1回あたり24時間を超えて貼り続けないでください。さらに、同じ患部に貼りかかる場合は、その貼付部位を発疹・発赤・かゆみ・かぶれなどの症状が起きていなければ、その原因となるいる病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけを使用してください。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとめてから使用してください。(5)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・かぶれなどの症状が起きないと確めてから使用してください。(6)使用部位に他の外用剤を併用しないでください。

成 分

膏体100g中 ジクロフェナクナトリウム……………1g
痛みのもとなるプロstagランジンの生成をおさえて痛みをやわらげます。

添加物:エステルガムHG、スチレン-イソブレン-スチレンブロック共重合体、流動ラバ(フィン・ポリイソブレン、N-メチル-2-ヒドロビン、ジブチルヒドロキシルエンド-メントール、その他3成分

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。

(2)小児の手の届かないところに保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わることがあります。)(4)品質保持のため、開封後の未使用分はもとの袋に入れて、開口部をきちんと閉めて保管してください。

(5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

【お問い合わせ先】

製品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

ノバルティス フーマ株式会社 客様相談室
〒106-8518 東京都港区西麻布4-17-30

●電話:03(5766)2615

●受付時間:9:00~17:00(土日祝・その他当社休業日を除く)

●製品に関する情報はこちら

<http://www.volturn-ac.jp>

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器組合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

●電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

