

鎮痛消炎薬

第1類医薬品

ここから開封
してください使用前に、箱に記載の説明文を必ず読んでください。
この箱を保管してください。

ジクロテクトテープ

- ジクロテクトテープは、医療用成分ジクロフェナクナトリウムを配合した外用の鎮痛消炎テープ剤です。
- 1日1回貼るだけで24時間効果が持続し、肩・腰・関節・筋肉のつらい痛みを鎮めます。
- 伸縮性に優れ、関節などの可動部にもぴったりフィットします。
- においが気になりません。●基布の色はベージュなので肌になじみ目立ちません。

8枚入
(7×10cm)

医療用成分 ジクロフェナクナトリウム

痛みや炎症の原因物質であるプロスタグランジンの生成を抑え、
つらい痛みに優れた効果を発揮します。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15才未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし、たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください
4. 連続して2週間以上使用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 他の医薬品を使用している人。(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。(6) 次の診断を受けた人。
消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ
- (7) 次の医薬品の投与を受けている人。
ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤(アスピリン等)、ステロイド剤、利尿剤、シクロスポリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤
- (8) 高齢者。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用中又は使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、屑(くさくさ)、フケ、アカのような皮ひのぼがれ、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
接触皮膚炎、 光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白癬があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等が全身にひろがる場合があります。また、日光があたった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

発売元

大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
http://www.taisho.co.jp

製造販売元

同仁医薬化工株式会社
東京都中野区弥生町5-2-2この製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
薬局・薬店又は下記にお願い申し上げます。連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

効 能

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腿膝炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回1～2枚を患部に貼ってください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

[注意] (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
(2) 1回あたり24時間を超えて貼り続けしないでください。さらに、同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確かめてから使用してください。(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。(5) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所(1～2cm角の小片を目安として)半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6) 使用部位に他の外用剤を併用しないでください。

成 分

膏体100g中 ジクロフェナクナトリウム………1g
(痛みや炎症の原因物質であるプロスタグランジンの生成を抑え、痛みをやわらげます)

添加物: エステルガムHG、ステリン・イソブレン・ステリンブロック重合体、流動パラフィン、ポリイソブレン、N-メチル-2-ピロリドン、ジブチルヒドロキシトレン、トメントール、その他3成分

副作用被害救済制度の
問い合わせ先(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/
kenkouhigai.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

4

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(4) 開封後の未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。(5) 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。