

くしゃみ・鼻みず・鼻づまり・なみだ目・頭が重い

鼻炎用内服薬

フロピン鼻炎チュアブル

【特徴】 —————どこでも水なしで服用できる鼻炎チュアブル—————

くしゃみ・鼻みず・鼻づまりは、かぜや、花粉によるアレルギー性鼻炎などによってよく起こる症状です。フロピン鼻炎チュアブルは、4種類の有効成分がこれらの症状にすぐれた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)
3. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。 (5) 次の症状のある人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 高熱、排尿困難
(3) 高齢者。 (6) 次の診断を受けた人。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、
こしたことがある人。 心臓病、高血圧、フェニルケトン尿症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

用法・用量

次の1回量を1日3回、かむか、口中で溶かして服用する。ただし、服用間隔は4時間以上おくこと。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1錠	3回
7歳以上15歳未満	1／2錠	
7歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 本剤は、用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1錠を分割した残りを服用する場合には、清潔な紙につつま外箱の中に保管し、2日以内に服用してください。
- (4) 錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているPTPシー（PTPシートの取り出し図）下の凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）



成分・分量 1日量（3錠）中

成 分	分 量
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6.0mg
フェニレフリン塩酸塩	15.0mg
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg
無水カフェイン	60.0mg

添加物としてトウモロコシデンプン、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、1-メントール、ステアリン酸Mg、セルロース、グリチルリチン酸2K、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 配置期限のすぎた製品は使用しないでください。

