

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

つらい鼻づまり、鼻みず早く効く

コルタイジン[®]点鼻液

〈点鼻薬〉

第②類医薬品

コルタイジン点鼻液は、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による鼻づまり、鼻みずなど不快な鼻炎症状を改善する鼻炎用点鼻薬です。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

- 次の人は使用しないでください。
 - 患部が化膿している人
 - モノアミン酸化酵素 (MAO) 阻害剤 (セレギリン塩酸塩等) で治療を受けている人
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
 - 高齢者
- 次の場合は、ただちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	眠気、頭痛、めまい、ふるえ、不眠、脱力感
鼻	はれ、刺激感、熱感、乾燥感、鼻みず
その他	血圧上昇、どろき、不整脈、口の渇き、味覚異常

- 3日間位使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

【用法・用量】

年 齢	1回量	1日使用回数
成人（15歳以上）	1～2度ずつ鼻腔内に噴霧 します。	3時間以上の間隔を置いて、 6回まで使用できます。
7歳以上15歳未満		
7歳未満	使用しないでください。	

〈用法・用量に関する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 点鼻用にのみ使用してください。
- 目には使用しないでください。

〈スプレーの使い方〉

使用前に鼻をかんでください。



〈使用にあたっての注意〉

- 噴霧するとき容器を下向きや横向きにしないで、必ず上向きでご使用ください。
- 容器の先端部を針などで突くと、折れたとき大変危険ですので絶対におやめください。



〔成分・分量〕


コルタイジン点鼻液は、無色透明の液剤で、1mL 中の成分、分量は次のとおりです。

成 分	分量
塩酸テトラヒドロソロン	1.0mg
プレドニゾン	0.2mg

添加物として、果糖、ベンザルコニウム塩化物、エタノール、pH 調整剤を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱及び容器に記載)のすぎた製品は使用しないでください。



〔包装〕

コルタイジン点鼻液：15mL

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

お客様相談室： ☎ 0120-834389

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

製造販売元

株式会社陽進堂

〒939-2723 富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

©J&J KK 2009

◎登録商標

003BBJ001

90486 T6