



毎日のつらい痛みに

サロンパス[®]EX

第2類医薬品

20枚入
サイズ:
5.4cm×8.56cm

サロンパスの
密着浸透力[®]

hisamitsu[®]

20枚入

毎日のつらい痛みに

Salonpas[®]

サロンパス[®]EX

インドメタシン
3.5%



当社従来品に比べて包装サイズを
小さくしました。

痛みに浸透

貼りやすい
コンパクトサイズ
(サイズ: 5.4cm×8.56cm)

微香性

セルフメディケーション

税 控除 対象

第2類医薬品

鎮痛消炎プラスター

製造番号

使用期限

第2類医薬品

サロンパス[®]EX



サロンパス[®]EX
第2類医薬品

※本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記のお客様相談室までお願い申し上げます。
久光製薬株式会社
〒841-0017 鳥栖市田代大宮町408番地

お客様相談室: TEL.0120-133250
受付時間: 9:00-17:50 (土日・会社休日を除く)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



サロンパス[®]EX
第2類医薬品

サロンパスの「密着浸透力[®]」とは、
サロンパスを肩こりや腰痛などの時に皮膚に貼った瞬間に皮膚の温度が上がり、有効成分が外部に浸透し、皮膚から深く浸透し痛みをシブシブと和らせます。それがサロパスの「密着浸透力[®]」です。



第2類医薬品

販売名: サロンパス[®]EX

ここを
押し開けて
ください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお
読みください。また、必要ときにすぐ
読めるように大切に保管してください。

Salonpas[®]

お客様
アンケート・
商品情報は
こちらへ▶



▼久光製薬の環境への取り組み
HELLO!eco!プロジェクトの
詳細はこちら。
<https://www.hisamitsu.co.jp>

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、
腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、
打撲、ねんざ

用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日
2回を限度として、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 11歳未満の小児に使用しないでください。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1〜2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

成分・分量 (膏体100g中)

インドメタシン…3.5g 4-メントール…3.5g

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、脂質飽和炭化水素樹脂、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 未使用分は袋に入れ、開口部をおりまげきちんと閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

特長

- インドメタシン3.5%配合の優れた鎮痛消炎効果。
- しなやか素材採用でやさしい貼り心地でかぶれ難い。
- 肩こりの関係部位(肩、首の付け根、肩甲骨周辺)などに貼りやすいコンパクトサイズ。
- 微香性なので使っていることが気にならない。

△ 使用上の注意

❌してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 11歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、かぶれ

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。