| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医薬品区分 | 一般用医薬品 |
| 薬効分類 | かぜ薬(内用) |
| 承認販売名 | |
| 製品名 | カイゲンかぜシロップ小児用S |
| 製品名(読み) | カイゲンカゼシロップショウニヨウS |
| 製品の特徴 | カイゲンかぜシロップ小児用Sは，非ピリン系のかぜ薬で，熱をさまし痛みを緩和する解熱鎮痛薬，くしゃみ・鼻水などアレルギー症状を緩和する抗ヒスタミン薬，せきをしずめたんの切れをよくする鎮咳去痰薬や去痰生薬(キキョウ，セネガ)の抽出エキスを加え，かぜの諸症状を緩和するのみやすいシロップ剤です。お子さまにやさしい(ノンカフェイン)です。 |
| 使用上の注意 | **■してはいけないこと**<br>**(守らないと現在の症状が悪化したり，副作用・事故が起こりやすくなります)**<br>1. 次の人は服用しないでください<br>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。<br>(2)本剤又は他のかぜ薬，解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。<br>(3)12才未満の小児。<br>2. 本剤を服用している間は，次のいずれの医薬品も使用しないでください<br>他のかぜ薬，解熱鎮痛薬，鎮静薬，鎮咳去痰薬，抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬，乗物酔い薬，アレルギー用薬等)<br>3. 服用後，乗物又は機械類の運転操作をしないでください<br>(眠気等があらわれることがあります。)<br>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか，本剤を服用する場合は授乳を避けてください<br>5. 服用前後は飲酒しないでください<br>6. 長期連用しないでください<br>**■相談すること**<br>1. 次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください<br>(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。<br>(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。<br>(3)高齢者。<br>(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。<br>(5)次の症状のある人。<br>高熱，排尿困難<br>(6)次の診断を受けた人。<br>甲状腺機能障害，糖尿病，心臓病，高血圧，肝臓病，腎臓病，胃・十二指腸潰瘍，緑内障，呼吸機能障害，閉塞性睡眠時無呼吸症候群，肥満症<br>2. 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この説明文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください<br><br>[関係部位:症状]<br>皮膚:発疹・発赤，かゆみ<br>消化器:吐き気・嘔吐，食欲不振<br>精神神経系:めまい<br>泌尿器:排尿困難<br>その他:過度の体温低下<br><br>まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。<br><br>[症状の名称:症状]<br>ショック(アナフィラキシー):服用後すぐに，皮膚のかゆみ，じんましん，声のかすれ，くしゃみ，のどのかゆみ，息苦しさ，動悸，意識の混濁等があらわれる。<br>皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群):高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤，赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る，全身がだるい，食欲がない等が持続したり，急激に悪化する。<br>中毒性表皮壊死融解症:高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤，赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る，全身がだるい，食欲がない等が持続したり，急激に悪化する。<br>急性汎発性発疹性膿疱症:高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤，赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る，全身がだるい，食欲がない等が持続したり，急激に悪化する。<br>肝機能障害:発熱，かゆみ，発疹，黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)，褐色尿，全身のだるさ，食欲不振等があらわれる。<br>腎障害:発熱，発疹，尿量の減少，全身のむくみ，全身のだるさ，関節痛(節々が痛む)，下痢等があらわれる。<br>間質性肺炎:階段を上ったり，少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる，空せき，発熱等がみられ，これらが急にあらわれたり，持続したりする。<br>ぜんそく:息をするときゼーゼー，ヒューヒューと鳴る，息苦しい等があらわれる。<br>再生不良性貧血:青あざ，鼻血，歯ぐきの出血，発熱，皮膚や粘膜が青白くみえる，疲労感，動悸，息切れ，気分が悪くなりくらっとする，血尿等があらわれる。<br>無顆粒球症:突然の高熱，さむけ，のどの痛み等があらわれる。<br>呼吸抑制:息切れ、息苦しさ等があらわれる。<br><br>3. 服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続又は増強が見られた場合には，服用を中止し，この説明文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください<br>便秘，口のかわき，眠気<br>4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し，この説明文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください |
| 効能・効果 | かぜの諸症状(発熱，せき，鼻水，鼻づまり，くしゃみ，頭痛，のどの痛み，たん，悪寒，関節の痛み，筋肉の痛み)の緩和 |
| 効能関連注意 | |
| 用法・用量 | 次の1回量を1日3回，食後なるべく30分以内および必要な場合には就寝前に服用してください。また場合によっては約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用してもさしつかえありません。<br><br>[年齢:1回量]<br>3才以上～7才未満:10mL<br>1才以上～3才未満:7mL<br>6ヵ月以上～1才未満:6mL<br>3ヵ月以上～6ヵ月未満:5mL<br>3ヵ月未満:服用させないでください |
| 用法関連注意 | (1)定められた用法・用量を厳守してください。<br>(2)小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させてください。 |
| 成分分量 | 60mL中<br>成分 / 分量 / 内訳<br>アセトアミノフェン / 300mg /<br>dl-メチルエフェドリン塩酸塩 / 20mg /<br>ジヒドロコデインリン酸塩 / 8mg /<br>クロルフェニラミンマレイン酸塩 / 2.5mg /<br>キキョウ流エキス / 1mL / (桔梗1000mg)<br>セネガ流エキス / 0.3mL / (セネガ300mg) |
| 添加物 | パラベン，デヒドロ酢酸ナトリウム，安息香酸ナトリウム，クエン酸水和物，クエン酸ナトリウム水和物，白糖，高果糖液糖，カラメル，バニリン，エタノール，ブドウ糖果糖液糖，グリセリン，香料 |
| 保管及び取扱い上の注意 | (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。<br>(2)小児の手の届かない所に保管してください。<br>(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)<br>(4)使用後は，汚染を防ぐため，ビンのフタをよくしめてください。<br>(5)本剤は，生薬エキスを配合していますので，わずかな濁りを生ずることもありますが，効果には変わりありませんので，よく振ってからご使用ください。<br>(6)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。 |
| 消費者相談窓口 | 会社名:カイゲンファーマ株式会社<br>問い合わせ先:お客様相談室<br>電話:06-6202-8911<br>受付時間:9:00～17:00(土曜，日曜，祝日を除く) |
| 製造販売会社 | カイゲンファーマ(株) 添付文書情報<br>会社名:カイゲンファーマ株式会社<br>住所:大阪市中央区道修町二丁目5番14号 |
| 販売会社 | |
| 剤形 | 液剤 |
| リスク区分等 | 第「2」類医薬品 |