

ホットリフェンダH 30枚入

鎮痛・消炎温感パップ剤

第3類医薬品

【特長】

- 粘着力が強く、皮ふにピッタリ良くつきます。
- トウガラシエキスが、患部に適度な温感効果をもたらします。
- 皮ふにやさしい弱酸性です。
- 伸縮性タイプの不織布で関節部位の貼付にも便利です。

【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】
次の部位には使用しないで下さい。

(1) 眼の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み等

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】

表面のフィルムをはがして、1日1～2回患部に貼付して下さい。
必要な時は、包帯又はテープでとめて下さい。

お問い合わせ先:株式会社タカミツ
フリーダイヤル 0120-459533/受付時間 (月～金曜日 9:00～17:00 祝祭日を除く)

【用法・用量に関する注意】

1. 定められた用法・用量を守って下さい。
2. 体の表面に脂や汗がある場合は、よく拭き取ってから貼付して下さい。
3. 本剤に触れた手で、眼、鼻腔、唇等の粘膜に触れないよう注意して下さい。
4. 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督の下に使用させて下さい。
5. 本剤の使用により、特に強いかゆみや痛みが出た場合は、直ちにはがして濡れタオルで拭いて下さい。
6. 入浴に際しては、1時間以上前にはがして下さい。はがした直後に入浴すると、強い刺激を感じることがあります。又入浴後30分位過ぎてから貼して下さい。
7. 貼った部分を、コタツや電気毛布等で温めないで下さい。強い刺激を感じることがあります。

【成分・分量】 <膏体 100g (1000cm²)中>

サリチル酸メチル 0.5g トウガラシエキス 0.165g
dL-カンフル 0.3g (原生薬換算量2.06g)
トコフェロール酢酸エステル 0.3g

※ 添加物としてエデト酸Na水和物、メタケイ酸アルミン酸Mg、カオリン、CMC-Na、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、D-ソルビトール、グリセリン、酒石酸、ポリソルベート80、ラウリン酸ソルビタン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、ヒマシ油を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 使用後は、未使用分を袋に戻し、外気に触れないよう開封口のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
3. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
4. 他の容器に入れ替えないで下さい。
[誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。]
5. 使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
6. 開封後は、品質保持の点からなるべく早くご使用下さい。

【包装】30枚入 (6枚入×5袋/1枚:10cm×14cm)

製造販売元

株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市中区上飯田東町4の68の1



4 987487 101665

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149931(フリーダイヤル)



第3類 医薬品

鎮痛・消炎温感パップ剤

HOT REFENDAH

ホットリフェンダH

30枚入 (6枚入×5袋)

腰痛・肩こり・筋肉痛に