

第1類医薬品

フェイタス®Z

鎮痛消炎成分 ジクロフェナクナトリウム配合

4枚入
(7cm×10cm)

第1類医薬品



4枚入
(7cm×10cm)

フェイタス®Z

テープ

1日1回でしつこい痛みに効く

鎮痛消炎成分
ジクロフェナク
ナトリウム配合

全方向に
伸び縮みする

腰痛、筋肉痛、肩こりに
伴う肩の痛み、関節痛、
腱鞘炎(手・手首の痛み)、
肘の痛み(テニス肘など)、
打撲、ねんざ

鎮痛消炎成分
ジクロフェナクナトリウム配合

フェイタス®Z

第1類医薬品

製造番号

使用期限

紙
2912HT

鎮痛消炎成分 シクロフェナクナトリウム配合

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (株)医薬品医療機器総合機関
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎ 0120-149-931

製造番号

使用期限

お電話相談受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00、18:00～20:00
お電話相談料金：0120-133250

第1類医薬品 鎮痛消炎成分 ジクロフェナクナトリウム配合
4枚入 (7cm×10cm)

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

ここを
押し開けてください。

特長

フェイタスZは、鎮痛消炎成分ジクロフェナクナトリウムが肩や腰、関節などのつらい痛みにすぐれた効きめをあらわします。

△ 使用上の注意

☒ としてはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起したことがある人。
- (3)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。
- (3)みずしむし、たむし等又は化膿している患部。

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。

4. 運続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)他の医薬品を使用している人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人。
- (5)次の診断を受けた人。消化性潰瘍、血液障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ
- (6)次の医薬品の投与を受けている人。
—ユーキノン系抗菌剤、トリアムテレジン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤、ステロイド剤、利尿剤、ジクロスピロリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤
- (7)高齢者。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい脱落)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎	貼付部に強いかゆみを伴う発疹、発赤、はれ、刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮膚炎症や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹、発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることがあります。
光線過敏症	日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

第1類医薬品

販売名: フェイタスZ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

効能・効果

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日1回1~2枚を患部に貼付してください。ただし、1回あたり2枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 15歳未満の小児に使用させないでください。(2) 用法・用量を厳守してください。(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を自らとして半日以上貼り、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないと確めてから使用してください。(5) 1回あたり、24時間を超えて貼り続けないでください。さらに、同じ患部に貼りかえる場合は、その貼付部に発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きていないことを確かめてから使用してください。(6) 同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。(7) 汗をかいたり、患部がぬれています時は、よく拭き取ってから使用してください。

成分・量

成分	含量(膏体100g中)
ジクロフェナクナトリウム	1.0g

添加物として、エステルガムHG、N-メチル-2-ピロリドン、L-メントール、スチレン-イソブレン-スチレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他3成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない温湿度の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になつたり、品質が変わることがあります)。(4) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。(5) 未使用分は袋に入れ、開口部を折りまげきちんと閉めて保管してください。