

コレステロールを下げたい方に

第3類医薬品

血清高コレステロール改善薬

**ローカスタ<sup>®</sup>****シオノギ製薬**

ローカスタは、パンテチンの働きによって脂質代謝を改善し、血中の総コレステロールやLDL（悪玉）コレステロールを減少させます。またソイステロール（大豆油不けん化物）が、コレステロールの腸管からの吸収を阻害し、体外への排泄を促します。さらに、天然型ビタミンE（酢酸 $d$ - $\alpha$ -トコフェロール）は、血管に障害を与える過酸化脂質の増加を抑える働きがあり、末梢の血行をよくします。



使用上の注意……

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

| 関係部位  | 症 状                   |
|-------|-----------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ             |
| 消 化 器 | 吐き気、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください  
下痢、軟便
- 1ヵ月位服用してもコレステロール値の改善がみられない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください（1ヵ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をすること）
- 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

……効能・効果……

血清高コレステロールの改善

血清高コレステロールにともなう末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）の緩和

……用法・用量……

次の量を食後におのみください。

| 年 齢       | 1回量      | 1日服用回数 |
|-----------|----------|--------|
| 成人（15才以上） | 2カプセル    | 3回     |
| 15才未満     | 服用させないこと |        |

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行ってください。

### ……成分・分量……

ローカスタは、淡黄色の楕円形の軟カプセル剤で、6カプセル（成人1日量）中に次の成分を含有しています。

| 成分                                   | 含量（6カプセル中）             |
|--------------------------------------|------------------------|
| パンテチン                                | 375mg<br>（脱水物換算 300mg） |
| 大豆油不けん化物（ソイステロール）                    | 600mg                  |
| 酢酸 $d$ - $\alpha$ -トコフェロール（天然型ビタミンE） | 100mg                  |

添加物として ポリソルベート80、サフラワー油を含有しています。またカプセル本体に、ゼラチン、濃グリセリン、D-ソルビトール液、酸化チタン、黄色5号を含有しています。

### ……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。（ビンのフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めてください）
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- (5) 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から、なるべく早めにご使用ください。
- (7) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



### ……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®:登録商標

販売元

**塩野義製薬株式会社**

大阪府中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

**明治製薬株式会社**

富山県滑川市の中川原77番地