

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

カルニチン配合

リポビタンFB

販売名：リポビタンFB

指定医薬部外品

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

【効能】

☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】

定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製剤を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）

【成分】 100mL 中

タウリン	1000mg
カルニチン塩化物	300mg
イノシトール	200mg
チアミン硝酸物（ビタミンB ₁ ）	5mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB ₂ ）	10mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	5mg
ニコチン酸アミド	30mg
無水カフェイン	50mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、スクラロース、アセスルファムK、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、香料、グリセリン、バニリン

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬(株) お客様119番室
電話 03-3985-1800

大正製薬  株式会社¹¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—