

ガンコな
かゆみに!

Kowa

かゆみ・虫さされに


プチウナ_α



ブユ



ダニ



蚊

赤みが残る
虫さされ、
かゆみに効く!

12mL

第②類医薬品

◀開け口

第②類医薬品

製造
番号
使用
期限

かゆみ・虫さされ用薬

プチウナ^α

使用上の注意 **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1. 次の部位には使用しないこと (1) 水痘 (水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。(2) 創傷面。(3) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口唇等)。(2) 顔面には、広範囲に使用しないこと 3. 長期連用しないこと **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。(5) 湿潤やただれのひどい人。2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談すること (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果 かゆみ、虫さされ

用法・用量 1日数回適量を患部に塗布する。＜用法・用量に関連する注意＞ (1) 用法・用量を守ること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4) 外用にのみ使用すること。(5) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。また、ひざの裏やひじの内側等に使用の場合は、皮膚を密着 (正座等) させないこと。

〈ステロイド成分配合〉




3 4 987067 247202

この説明書は本剤とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

12mL



〔容器の正しい使い方〕



成分・分量 (1mL中) デキサメタゾン酢酸エステル0.25mg ジフェンヒドラミン塩酸塩20.0mg リドカイン5.0mg l-メントール30.0mg dl-カンフル20.0mg

〔添加物〕エデト酸Na、クエン酸、ゲラニオール、エタノール

保管及び取扱い上の注意 (1) 高温をさへ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 容器が変形するおそれがあるので、車の中など、高温になる場所に長時間放置しないこと。容器の変形により、塗布部の脱落や、液もれがおこるおそれがあるので注意すること。(5) 本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水が洗剤で洗い落とすこと。(6) メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意すること。(7) 火気に近づけないこと。(8) 使用期限 (台紙及び容器に記載) をすぎた製品は使用しないこと。



お問い合わせ先
興和株式会社 お客様相談センター
TEL 03-3279-7755 月～金(祝日を除く) 9:00～17:00

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14



成形シート: PET ボトル: PP
キャップ: PP ラベル: PET
中 栓: PE

T1603 C9K 98120