

虫さされ・
かゆみ用薬 **ウナコーグジェル**

蚊やダニ、ブユなどにさされたり、湿疹が出たりすると、皮ふは敏感に反応してかゆくなります。そのまま放置すると、かゆみが次第に強くなったり、赤くはれてきたりします。赤みが続いた部位には、皮ふにシミのようなあとが残ることもあります。

ウナコーグジェルは、このような症状にしっかりと効くように製剤設計されています。ウナコーグジェルを塗りますと、まずリドカインがかゆみの伝わりを止めるのと同時に、ジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみのもととなるヒスタミンの働きを抑えます。さらに、デキサメタゾン酢酸エステルがかゆみの悪化や患部が赤くはれる原因となる「炎症」を抑えることで、これらの症状にしっかりと効きます。

「炎症」は早く処置するほど効果的です。虫さされなどの赤み・かゆみには、ウナコーグジェルで早めのお手当てをおすすめします。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1.次の部位には使用しないこと

- (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2)創傷面。
- (3)目や目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)。

2.顔面には、広範囲に使用しないこと

3.長期連用しないこと



相談すること

1.第一次は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

2.第二次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師

又は薬剤師に相談すること

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

虫さされ、かゆみ、湿疹、かぶれ、皮膚炎、あせも、ただれ、しもやけ、じんましん

用法・用量

1日数回適量を患部に塗布する。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を守ること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- (3)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4)外用にのみ使用すること。
- (5)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮ふを密着(正座等)させないこと。

成分・分量(1g中)

成分・分量	働き
デキサメタゾン酢酸エステル 0.25mg	かゆみが悪化したり皮ふが赤くはれる原因となる炎症を抑えるステロイド成分です。
ジフェンヒドラミン塩酸塩 20.0mg	湿疹やかゆみ等のもととなるヒスタミンの働きを抑えて、湿疹やかゆみを鎮めます。
リドカイン 5.0mg	局所麻酔作用により、かゆみの伝わりを止め、かゆみを感じなくします。
l-メントール 35.0mg	患部に清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
dl-カンフル 30.0mg	

[添加物]ヒプロメロース、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、エデト酸Na、ジイソプロパノールアミン、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わること。)
- (4)本剤のついた手で、目など粘膜に触れないこと。
- (5)本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落とすこと。
- (6)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質があるので、付着しないように注意すること。
- (7)火気に近づけないこと。
- (8)使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00



製造
販売元

興和株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14