

あせも、かぶれ、湿疹、かゆみに!

鎮痒消炎薬

レスタミン^γパウダークリーム

衣服、アクセサリーなど、肌に直接触れるものや汗は、湿疹、かぶれやあせも等のトラブルを引き起こす原因となることがあります。特に赤ちゃんや肌が敏感な方は、それらの刺激による肌トラブルが起こりやすく、かきむしったりすることで悪化してしまうこともあります。

レスタミン^γパウダークリームは、抗ヒスタミン成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩、炎症を抑えるグリチルレチン酸、収れん・保護成分である酸化亜鉛を配合しており、あせもやかぶれ、湿疹などにすぐれた効きめをあらわします。

やわらかくのびのよいクリームですので広い範囲にもすーっとぬれますし、ぬった後はベトベトせず、パウダーをつけたような爽やかさが残ります。

肌がかゆくなったり、赤いポツポツ、ブツブツなどの症状が出たらお早めにご使用ください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って
医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

あせも、かぶれ、湿疹、かゆみ、ただれ、皮膚炎、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回適量を患部に塗布する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を守ること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。

成分・分量(1g中)

成分・分量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩 20mg	湿疹やかゆみ等のもとなるヒスタミンの働きをおさえ、湿疹やかゆみ等にすぐれた効きめがあります。
酸化亜鉛 100mg	皮膚表面を乾燥させ、治りを助けます。
グリチルレチン酸 1mg	あせも・ただれ・かぶれ等を起こしている皮膚の炎症をしずめます。

[添加物] 無水ケイ酸、ヒドロキシエチルセルロース、セタノール、ステアリン酸、ミリスチン酸オクチルドデシル、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸ポリオキシシル、ポリソルベート20、オレイン酸ソルビタン、パラベン、クエン酸、香料、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないこと。



使用後は必ず
キャップをしっかり
しめてください。

本製品に関するお問い合わせは

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00



製造
販売元

興和株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

