

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

スルーラックデトファイバーM

第②類医薬品

便秘薬 腸内に溜まった老廃物(滞留便)をスムーズに排出 マンゴー風味

- スルーラックデトファイバーMは、プラントゴ・オバク種皮末(植物繊維)とジュウヤク末(どくだみ)など4つの植物由来成分のチカラで、腸内に溜まった老廃物(滞留便)を、スムーズに排出する便秘薬です。
- 植物繊維が、腸内で水分を含むことにより、かさを増し、便を適度なやわらかさにします。
- ジュウヤク末(どくだみ)やアロエエキス、センノサイドカルシウムが大腸の動きを高め、腸内の老廃物(滞留便)をスムーズに押し出します。
- のみやすいマンゴー風味の顆粒です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- ① 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬(下剤)
- ② 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- ③ 大量に服用しないでください



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
(5) 次の診断を受けた人。フェニルケトン尿症
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- ④ 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 便秘
- 便秘にともなう次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

次の量をなるべく空腹時に水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	1～2包	✕服用しないこと
1日服用回数	1～2回	

●空腹時の目安：食後なるべく2時間以上

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)本剤を口にはみ、コップ1杯(約180mL)の水又はぬるま湯で服用してください。

成分と作用

成分	4包中	作用
ブランタゴ・オバタ種皮末	4400mg	腸内で水分を吸収して膨潤し、便のかさを増やして排便を促します。
アロエエキス	375mg (アロエ 750mgに相当)	腸粘膜を刺激して緩下作用をあらわします。
センノサイドカルシウム	40mg (センノシドA・Bとして14.4mg)	生薬センナの有効成分で、大腸内の腸内細菌により代謝され、緩下作用をあらわします。
ジュウヤク末	500mg	便秘に伴う肌あれを改善します。

添加物：無水ケイ酸、D-ソルビトール、ヒドロキシプロピルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、アルコール、プロピレングリコール、クエン酸Na、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、カンゾウ、グリチルリチン酸2K、香料
○本剤配合成分のセンノサイドカルシウムにより、尿が橙色又は赤色をおびることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

