

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

血清高コレステロール改善薬 コレステロールは改善できる イーフスカット®

第3類医薬品

高コレステロールは、自覚症状がなく、自分では気づきにくい症状です。本商品の服用後は定期的に医療機関でコレステロール値の測定をお勧めします。

商品特長

- 『イーフスカット』は、血清高コレステロールを改善し、また、血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)を緩和する医薬品です。
 - 大豆由来成分の「大豆油不けん化物」は、腸管からのコレステロール吸収を抑える働きがあります。
 - パンテチンは、肝臓でのコレステロールの代謝を良くし、余分なコレステロールを減少させる働きがあります。
 - 天然型ビタミンE(酢酸d- α -トコフェロール)は、血液の流れを良くし、過酸化脂質の生成を抑えて血管を守る働きがあります。
- 『イーフスカット』はこれら3つの有効成分の力により効果を発揮します。

⚠️ [使用上の注意]



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛、はきけ

(2) 1ヶ月位服用してもコレステロール値の改善がみられない場合。

(1ヶ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値を測定すること。)

3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。
出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

下痢、軟便

効能・効果

- 血清高コレステロールの改善
- 血清高コレステロールに伴う末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）の緩和

用法・用量

次の量を食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行ってください。

成分・分量

成人1日量(6カプセル)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	はたらき
パンテチン (80%パンテチン水溶液)	375mg	肝臓におけるコレステロール代謝の促進により、血液中の過剰なコレステロールを減少させ、血管壁への沈着を抑えます。
大豆油不けん化物 (ソイステロール)	600mg	大豆由来の成分で、腸管からのコレステロールの吸収を抑制し、排泄を促進します。
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	抗酸化作用により、過酸化脂質の生成を抑制し、末梢血行障害を改善します。

添加物としてサフラワー油、ポリソルベート80、カプセルにグリセリン、酸化チタン、サンセツトイエローFCF、ゼラチン、D-ソルビトールを含んでいます。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
また、服用のつどピンのフタをしっかりとめてください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 田村薬品工業株式会社 お客様相談室 06-6203-5151 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)
--

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)