

この説明書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

アレルギー用薬

第2類医薬品

プラタギン[®]AZ

私たちの体の中にはヒスタミンやロイコトリエンなどの体内物質があり、アレルギーの発症に関与しています。これらはふだん特定の細胞内にあって、アレルギー反応を示しませんが、例えば、うるしに触れたり、鶏卵や鯖などを食べたり、花粉やハウスダストなどを吸い込んだりすると、それらにアレルギーをもつ人では、ヒスタミンなどがその作用を示し、発疹ができたりくしゃみや鼻水が出たりします。プラタギンAZは、ヒスタミンやロイコトリエンなどの作用を抑制することにより、鼻や皮ふの各種アレルギー症状を改善します。

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 15才未満の小児
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のアレルギー用薬（皮ふ疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬）

3. 服用時は飲酒しないでください

4. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります)

5. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

6. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 高齢者
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) アトピー性皮ふ炎、またはアトピー素因があると診断を受けた人
- (5) 気管支ぜんそくの診断を受けた人
- (6) 発熱やせき、黄色で粘りのある鼻みずなどのかぜ症状がある人
- (7) 鼻炎の場合でアレルギー性鼻炎か、かぜによる鼻炎かわからない人
または、皮ふの症状が「じんましん、湿疹・かぶれ」によるものか、虫さされや化膿等他の原因によるものかわからない人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤
消 化 器	悪心・嘔吐、口内及び口周囲のあれ、食欲不振、胸やけ、胃部不快感、腹痛
精神神経系	倦怠感、めまい、頭痛、手足のしびれ
肝 臓	全身のだるさ、皮ふや白目が黄色くなる
そ の 他	顔面のほてり、動悸、息苦しさ、鼻乾燥、頻尿、排尿困難、血尿、浮腫、月経異常

- (2) 鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮ふの症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善がみられない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘、下痢、眠気

4. 鼻炎の症状の場合で2週間以上服用する場合は、医師又は薬剤師に相談して服用してください

5. じんましん、湿疹・かぶれなど皮ふの症状の場合で、症状の軽減がみられるが繰り返し症状が起こるなど1週間以上症状が継続する場合は、医師又は薬剤師に相談してください

■ 効能・効果

○花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり

○じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮ふのはれ、かゆみ

■ 用法・用量

1日2回、次の量を朝食後及び就寝前に水又はお湯で服用してください。

年齢	成人（15才以上）	15才未満
1回量	1カプセル	服用しないこと

ただし、鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮ふの症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善がみられない場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

【用法・用量に関連する注意】

(1)花粉など季節性のアレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。

(2)かみくだかないように早めにのみこんでください。（苦味を感じる場合があります。）

(3)カプセルの取り出し方

右図のように、カプセルの入っているシートの凸部を指先で強く押し、裏面の膜を破り、カプセルを取り出して服用してください。

（誤ってシートのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）

（カプセルの取り出し図）



■ 成分と働き


成人1日量 2カプセル中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	働き
アゼラスチン塩酸塩	2mg	アレルギー症状の原因となるヒスタミンやロイコトリエンなどの作用を抑えて、鼻や皮ふのアレルギー症状を緩和します。

添加物として、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシル35ヒマシ油、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、緑色3号を含んでいます。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



■ お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



発売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18



製造販売元
株式会社バイオメディクス
岐阜県可児郡御嵩町御嵩2193-128