



ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。  
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

第3類医薬品



ウルソデオキシコール酸配合

# エルビタンE

ビタミンEは、末梢血管の血液循環を促進する働きがあり、血行を良くし、末梢血行障害によって起こる様々な症状を緩和します。

エルビタンEは、ビタミンEとしての効力が最も高い天然ビタミンE（d- $\alpha$ -トコフェロール）を主成分とし、ビタミンEの吸収を高めるウルソデオキシコール酸が配合されています。さらにビタミンB<sub>1</sub>誘導体、イノシトールヘキサニコチン酸エステル、ビタミンB<sub>6</sub>、ガンマーオリザノール、ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステルの5種類を配合した製品です。



## ⚠️ [使用上の注意]

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。  
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

## [効能・効果]

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：
  - 肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和：
  - 肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
 

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

（裏面もお読みください）

## [成分] 1日量（3カプセル）中

d- $\alpha$ -トコフェロール（ビタミンE）…………… 300mg  
フルスルチアミン塩酸塩（ビタミンB<sub>1</sub>誘導体）…………… 25mg  
（フルスルチアミンとして）…………… 22.9mg  
イノシトールヘキサニコチン酸エステル…………… 150mg  
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB<sub>6</sub>）…………… 50mg  
ガンマーオリザノール…………… 10mg  
ウルソデオキシコール酸…………… 12mg  
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステル）… 12mg  
添加物として、ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、サ  
ラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、グリセリン、  
D-ソルビトール、酸化チタン、赤色102号、黄色5号、青色1号  
を含有します。

### <成分に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸  
エステル（ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステル）によるものですので心配ありませ  
ん。

## [用法・用量]

次の1回量を食後に水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1カプセル	3 回
15歳未満の小児	服用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。


## [保管および取扱上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) 箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、製品をこの文書  
とともに箱に入れたまま保管してください。
- (5) 一度開封した後は、品質保持の点から6ヵ月以内に服用してください。  
なお使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### (6) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTP  
シートの凸部を指先で強く押し、裏面の  
アルミ箔を破り、取り出してお飲みくだ  
さい。（誤ってそのまま飲み込んだりす  
ると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故  
につながります）

（PTPシートの取り出し図）  
おしだす



本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社