

新リコソ錠[®]

成分及び分量 (9錠中)

ジヒドロコデインリン酸塩	30mg
d l -メチルエフェドリン塩酸塩	50mg
ジブロフィリン	100mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg
キキョウ末	300mg
ケイヒ末	150mg

添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、セルロース、サッカリンNa、カルメロースCa、タルク、ステアリン酸Mg、*l*-メントール

用法及び用量

大人(15歳以上)	1回	3錠
12歳以上15歳未満	1回	2錠

1日3回なるべく空腹時を避けて服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。

- * (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 12歳未満の小児は服用しないこと。

効能又は効果

せき、たん

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 服用に際しては、裏面の使用上の注意をよく読むこと。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

電話：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



⚠️《使用上の注意》

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後は乗物等の運転をしないこと(眠気等があらわれることがある)。
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
4. 過量服用・長期連用しないこと。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循 環 器	動悸
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。