


アンダーライン部分は2019年8月に追記しました。

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

総合感冒薬

かぜぐすり ジキナ顆粒ゴールド[®] (非ピリン系)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

(3)12才未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。


他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

5. 服用前後は飲酒しないでください。

6. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人 高熱、排尿困難

(6)次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状	関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい	その他	過度の体温低下
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌尿器	排尿困難		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステーキンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壞死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーザー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

裏面もお読みください。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒(発熱によるさむけ)、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上(成人)	1包	3回
12才以上15才未満	2/3包	
12才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1日量 3包(1包1,200mg)中

成 分	含 量	は た ら き
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりを抑えます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき中枢の異常な興奮を抑えてせきをしのぎます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を広げ、せきをしのぎます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	250mg	たんをやわらかくして出しやすくします。
無水カフェイン	75mg	頭痛を和らげ、眠気を軽減します。
ベンフォチアミン (ビタミンB1)	25mg	発熱時に消耗しがちなビタミンを補います。
リボフラビン (ビタミンB2)	12mg	
ヘスペリジン (ビタミンPの一種)	45mg	
カンゾウ末	800mg	のどの炎症を抑えます。
セネガ乾燥エキス	24mg (原生葉換算量:400.8mg)	気道粘膜の分泌を促進してたんを出しやすくします。

添加剤:乳糖水和物、クロスCMC-Na、マクロゴール、ポビドン、DL-リンゴ酸、サッカリンNa水和物、D-マンニトール 含有
〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります、これは本剤中のリボフラビンによるものなので心配はいりません。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。) (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。 (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品（学術室）
電話 (048)648-1118 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)