

第2類医薬品

販売名:ザハップフェルビナクス

ザハップ[®] フェルビナクス

つらい
痛みに効く
肩の痛み・関節痛

けんしょうえん
腱鞘炎



ひんやり気持ちいい

急冷感



高含水パップ剤

クォーターサイズ
(7cm×5cm)

肩の痛み



筋肉痛



6枚入



ご使用に際して、この箱の
説明書きをよくお読みくださ
い。また、必要な時に読めるよう
大切に保管してください。

押しあける

第2類医薬品

ザハップ フェルピナクs

特長

- 効き目成分フェルピナクを配合
- 急冷感がひんやり気持ちいい
高含水パップ剤
- 切らずにそのまま貼れる便利な
クォーターサイズ
- 肌にやさしくフィットして、はが
れにくい不織布を使用

毎日のこんな痛みに



⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が
悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 今までに本剤又は本剤の成分によりア
レルギー症状 (例えば発疹・発赤、かゆ
み、かぶれ等) を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販 売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こし
たことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作 用の可能性があるため、直ちに使用を中止 し、この説明書きを持って医師、薬剤師又 は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ等

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりな い場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、
腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み
(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

1日2回を限度として、患部にお貼りください。
<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている
病気を治療するのではなく、痛みやはれ等
の症状のみを治療する薬剤なので、症状が
ある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいた後や皮膚がぬれている場合は、
よく拭き取ってからお貼りください。

成分・分量(膏体2.5g/枚)

フェルピナク……0.7g(膏体100g中)
添加物として、 α -ソルビトール、グリセリン、ポリアクリ
ル酸部分中和物、プロピレングリコール、カルボキシビニ
ルポリマー、ジイソプロパノールアミン、 α -メントール、
ヒマシ油、メタケイ酸アルミン酸Mg、エドト酸Na、メチ
ルパラベン、プロピルパラベン、酒石酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい
所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用
の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 品質保持のため未使用分は元の袋に入れ、開口
部を二重に折り込み密閉し、保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封後は、なるべく早く使用してください。

®:登録商標

S120402

使用期限

製造番号