

肩こり

痛みのもとに  
密着浸透!

140 枚入  
(6.2cm×4.2cm)

保存袋付

開封口▶▶▶

鎮痛消炎プラスター  
ニューパス(A) 第3類医薬品

肩こり・筋肉痛・腰痛

販売名: ニューパス(A)

鎮痛消炎薬

第3類医薬品

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 次の人は使用しないこと  
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の部位には使用しないこと  
(1) 目の周囲、粘膜等。  
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 3. 5-6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋内疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1-2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1-2cm角の小片を自安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

1枚(6.2cm×4.2cm)

成分及び分量 1.0m<sup>2</sup>中

dl-カンフル .....1.80g  
 サリチル酸メチル .....9.00g  
 ハッカ油 .....1.20g  
 トメントール .....4.50g  
 トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) .....0.50g  
 ノニル酸ワニルアミド .....0.01g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル-アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 大協薬品工業株式会社

東京都中央区本町2-17-7

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)

お問い合わせ先 大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

電話: 076-479-1313

受付時間 9:00-17:00(土、日、祝日を除く)

痛みのもとに  
密着浸透!

140 枚入  
(6.2cm×4.2cm)

保存袋付



肩こり



筋肉痛



腰痛

鎮痛消炎プラスター  
ニューパス(A)

第3類医薬品

ムレにくい  
穴あき  
タイプ

痛みのもとに  
密着浸透!

140 枚入  
(6.2cm×4.2cm)

保存袋付

肩こり  
筋肉痛  
腰痛

ビタミンE配合

鎮痛消炎プラスター  
ニューパス(A)


第3類医薬品

ムレにくい  
穴あき  
タイプ

痛みのもとに  
密着浸透!

140 枚入  
(6.2cm×4.2cm)

保存袋付



肩こり



筋肉痛



腰痛

鎮痛消炎プラスター  
ニューパス(A)

第3類医薬品

ムレにくい  
穴あき  
タイプ

T12

製造番号

使用期限



4 987754 103637