

肩

体力中等度又は
やや虚弱な方の

四十肩 五十肩 肩こり



寝ちがえに

満量処方

1日最大量 21.5g の生薬から
抽出して得られたエキスを
全量配合した顆粒剤

内から
生薬
の効果!!

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する時には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 **阪本漢法製薬**
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

肩

飲んで 効く

体力中等度又は
やや虚弱な方の

内から
生薬
の効果!!

四十肩 五十肩 肩こり

寝ちがえに

飲んですぐ溶ける顆粒 (独活葛根湯)
パスタントン顆粒

第2類医薬品 21包 **満量処方**

服用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入しておりませんので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

漢方製剤
(独活葛根湯)

第2類医薬品

【販売名】パスタントン顆粒

【効能・効果】

体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：
四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり

【用法・用量】

成人(15歳以上) 1回1包を1日3回
食前又は食間に服用してください。
* 15歳未満は服用しないでください。
* 食間とは食後2～3時間を指します。
* 微温湯又は水で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

1日量3包(1包3g)中
独活葛根湯乾燥エキス 3.8g

成分	分量	成分	分量
日局 カッコン	5g	日局 ショウキョウ	0.5g
日局 ケイヒ	3g	日局 ジオウ	4g
日局 シャクヤク	3g	日局 タイソウ	1g
日局 マオウ	2g	日局 カンソウ	1g
日局 ドクカツ	2g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、
ステアリン酸マグネシウム

<成分・分量に関連する注意>
本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

押して開ける

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人
(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

S3



4 987076 626043



袋:PE、金属



製造番号

使用期限