



sato

セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

漢 方 薬

ストナ[®]漢方かぜフルー

ストナ漢方かぜフルーは…

- 漢方薬「竹茹温胆湯（チクジョウウンタントウ）」をのみやすい顆粒にしました。
- 体力中等度の方のかぜ・インフルエンザなどの回復期に長びく熱や、平熱になっても咳、たんが多くて安眠できない場合に効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

〔効 能〕

体力中等度のものの次の諸症：かぜ、インフルエンザ、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、また平熱になっても、気分がさっぱりせず、せきやたんが多くて安眠が出来ないもの

〔用法・用量〕

下記の1回服用量を、食前又は食間に水又は温湯で服用してください。(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	2回
7～14才	2/3包	
4～ 6才	1/2包	
2～ 3才	1/3包	
2才未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕2包中(1包2.5g)

竹茹温胆湯エキス……………5.3g
(乾燥物として約2.4g)

(竹茹温胆湯エキスは、下記生薬より抽出する。)	
柴 胡(サイコ)……………	1.5g
竹 茹(チクジョ)……………	1.5g
茯 苓(ブクリョウ)……………	1.5g
麦門冬(バクモンドウ)……………	1.5g
生 姜(ショウキョウ)……………	0.5g
半 夏(ハンゲ)……………	2.5g
香附子(コウブシ)……………	1.0g
桔 梗(キキョウ)……………	1.0g
陳 皮(チンピ)……………	1.0g
枳 実(キジツ)……………	1.0g
黄 連(オウレン)……………	0.5g
甘 草(カンゾウ)……………	0.5g
人 参(ニンジン)……………	0.5g

添加物として、デキストリン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸Mg、乳糖、香料(l-メントール)を含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号