



エクシブ[®] スプレー

水虫・たむし用薬

第2類医薬品

[販売名]メンソレータムエクシブスプレーe

![▲] 使用上の注意

■してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の人には使用しないこと 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人

2.次の部位には使用しないこと(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、脣等)、陰のう、外陰部等(2)湿疹(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

■相談すること

1.次の人には使用前に医師又は薬剤師に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)乳幼児(3)本人又は家族がアレルギー体质の人

(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人(5)患部が顔面、又は広範囲の人(6)患部が化膿している人(7)「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)(8)妊婦又は妊娠している可能性のある人

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、本剤を持って医師又は薬剤師に相談すること(1)使用後、次の症状があらわれた場合 皮ふ:発疹・発赤、かぶれ、かゆみ、はれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮フのはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮フの亀裂(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合

副作用被害救済制度の問合せ先
0120-149-931

[効能]水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
[用法・用量]1日1回、噴霧口を下に向けて適量を患部に噴霧してください

<用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法を厳守すること (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと
(3)目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること (5)外用にのみ使用すること (6)使用前によく振ること (7)患部まで5cmの距離で噴霧すること、なお、噴霧口をよく確かめ、顔面特に目に向けて噴霧したり、吸入しないこと (8)凍傷などの恐れがあるので、同じ箇所に連続して1秒以上噴霧しないこと



[成分・分量](原液100g中)

有効成分: テルピナфин塩酸塩…1.0g、リドカイン…2.0g、ジフェンヒドラミン…1.0g、グリチルレチン酸…0.1g

添加物: エタノール、ベンジルアルコール、クエン酸、BHT、香料

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)本剤のついた手で目や粘膜に触れないこと (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと (5)本剤は合成樹脂等を軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、家具や床等につかないようにすること (6)火気につかないこと

使用期限: 缶底に記載

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:DME

- 本品はフロンガスを使用していません
- 捨てるときには、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、捨てること

火気厳禁 原液35mL

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

TEL:06-6758-1230

受付時間 9:00-18:00(土、日、祝日を除く)