

みずむし・たむし用薬

フットガン

ヨーブ クリーム

水虫・たむしは白癬菌というカビの一種が皮ふ表面の角質層に寄生して起きる疾患で、不快なかゆみや様々な皮ふ症状を伴います。

フットガンヨーブクリームは、殺真菌成分ラノコナゾールを配合した水虫・たむし治療薬です。本剤はパウダー成分を配合した使用感のよいクリーム剤で、患部にお使いになりますと、ラノコナゾールが白癬菌を効果的に殺菌し、水虫・たむし症状を改善します。また、本剤に配合した2種類のかゆみ止め成分（ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミトン）が水虫・たむしの不快なかゆみをしずめ、組織修復成分のアラントインが患部の皮ふ症状（ジュクジュク、皮むけ等）を改善します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
(2)湿疹。
(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)乳幼児。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)患部が顔面又は広範囲の人。
(6)患部が化膿している人。
(7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等の原因による場合が多い。）
(8)妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、水疱、亀裂、乾燥・つっぱり感、ただれ

なお、「むくみ、息苦しさ」があらわれた場合には直ちに医師の診察を受けてください。

- (2)2週間位使用しても症状がよくならない場合や、使用后、症状がかえって悪化した場合（ただれたり、化膿したり、病巣が前より広がる等）

成分・分量（1g中）

成分・分量	働 き
ラノコナゾール 10mg	すぐれた浸透性により白癬菌を1日1回の使用で殺菌します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩 20mg クロタミトン 50mg	患部のかゆみをしずめます。
アラントイン 10mg	組織修復作用により、患部の皮ふ症状（ジュクジュク、皮むけ等）を改善します。

〔添加物〕セタノール、ステアリルアルコール、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、タルク、水酸化Na

効能・効果

みずむし、いんぎんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>


- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

効果的な治療方法

患部をよく洗ってから患部より広めに薬剤を塗布してください。菌の増殖や二次感染を防ぐため患部を清潔に保ちましょう。足は不潔にもなりやすいので特に清潔にしてください。また、再発しやすい病気ですから、自覚症状がなくなってからも2～4週間は治療を続けることが大切です。

容器の正しい使い方

キャップ上部の突起部でチューブの出し口(アルミシール)にしっかり穴をあけてお使いください。
*使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。



保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (5)使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00



発売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造販売元 東興薬品工業株式会社 富山県中新川郡立山町辻20