

第2類医薬品

八味地黄丸錠「創至聖」



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

◎ 用法・用量

次の量を食前または食間に水又は白湯で服用する。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15才以上）	4 錠	3 回
7才以上15才未満	3 錠	
7才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

◎ 効能・効果

疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿でときに口渇がある次の諸症：
下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ


◎ 成分・分量 1日量12錠（1錠300mg）中

成 分 名	分 量	成 分 名	分 量
ジ オ ウ 末	800mg	タ ク シ ャ 末	400mg
サンシュユ末	400mg	ブクリヨウ末	400mg
サンヤク末	400mg	ポ タ ン ピ 末	400mg
ケ イ ヒ 末	133mg	加 工 ブ シ 末	67mg

添加物：メタケイ酸アルミン酸Mg、カルボキシメチルスターチNa、シヨ糖脂肪酸エステル、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）を含有

◎ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
（ビン入の製品は密栓して保管すること。）
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）



次のような症状の方におすすめします。

1. 手足が冷えて、小便が近いか又は出にくく、口が渇くとき
2. 腰から下が衰弱した症状として、腰が痛い、しびれる又はむくみがあるとき
3. 老人のかすみ目、かゆみなど

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話番号：076-472-1011 受付時間：9：00～16：30（土、日、祝日を除く）