

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

せき止め薬 コンコン咳止め錠

第②類医薬品

「せき」はかぜの諸症状の代表的な症状です。かぜ等のとき、「せき」は非常に苦痛を伴う場合が多く長びくこともありますので早めに治すことをおすすめします。コンコン咳止め錠は生薬を配合し「せき」をしずめ「たん」を出やすくし、のどの負担をやわらげます。



使用上の注意



してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと**
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
 2. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと**
(眠気があらわれることがある。)
 3. **授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること**
 4. **過量服用・長期連用しないこと**



相談すること

1. **次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること**
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん
2. **次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること**
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症	状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ	
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振	
精神神経系	めまい	
その他	動悸、排尿困難	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. **次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること**
便秘、口のかわき

効能・効果

せき、たん

用法・用量

次の量を食後に、水又はお湯と一緒に服用すること。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15歳以上	4 錠	3 回
8 歳以上15歳未満	2 錠	
8 歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量 1 日量 (12錠) 中

成 分	含量	は た ら き
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきの中枢にはたらいで、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	50mg	せきを抑え呼吸を楽にします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	のどの炎症を抑えます。
ジプロフィリン	100mg	気管支の収縮を抑えてせきをしずめます。
無水カフェイン	90mg	抗ヒスタミン剤による眠気を抑えます。
カンゾウ末	500mg	のどの痛みを抑え、せきをしずめます。
キキョウ末	500mg	たんを出やすくします。
石蒜エキス	25mg	たんを出やすくします。

添加物：ケイ酸Al、セルロース、バレイショデンプン、タルク、ポビドン、セラック、炭酸Ca、白糖、ゼラチン、酸化チタン、ポリビニルアセテールジエチルアミノアセテート、カルナウバロウ

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと。
(ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがある。)
- (5) ペン内の詰め物は、輸送中の錠剤の破損防止用なので、開栓後は捨てること。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

中外医薬生産株式会社 お客様相談室

電話 0595-21-3200

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)



製造販売元

中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5