



飲用不可

殺菌消毒薬

第2類医薬品

ジクロシア[®]0.5g錠

ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム製剤

まぜるな危険

酸性の洗浄・漂白剤、
シアヌール酸系の製品と混合すると塩素ガス
が発生して危険ですのでおやめください。

2017年6月改訂

第2類医薬品

殺菌消毒薬

ジクロシア[®]0.5g錠

ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム製剤

100
錠入

発売元



ヨシダ製薬

吉田製薬株式会社

東京都中野区中央5-1-10

製造
販売元



日産化学工業株式会社

東京都千代田区神田錦町3-7-1

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

- 本品は飲まないでください。
- 手の荒れやすい方は、取扱い時に炊事用手袋などをご使用ください。

【使用上の注意】

相談すること

1. 本品をあやまって飲み込んだ時は、すぐに水、生卵、ミルク等を飲み、この製品を持って医師に相談してください。
2. 目に入らないように注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、この製品を持って眼科医に相談してください。
3. 本品の溶液との接触により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果、用法・用量】

効能・効果	用法・用量
哺乳びん・乳首の消毒殺菌	水2L当たり本品1錠を溶かした液に1時間以上浸す。
医療器具の消毒	水1L当たり本品1～2錠を溶かした液に数分間浸すか、清拭する。
器具・物品などの消毒	水1L当たり本品1～2錠を溶かした液に数分間浸すか、清拭する。
室内・便所・浴室の消毒	水1L当たり本品1～2錠を溶かした液で清拭する。

(用法・用量に関連する注意)

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 換気の良い場所で使用してください。
3. 液体タイプの塩素系洗浄・漂白剤、酸性の洗浄・漂白剤等との混合は危険ですので避けてください。
4. 金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びんバサミ、スプーン等の金属製品や、指輪等貴金属を本品の溶液につけることも避けてください。メラミン食器等には、本品の使用を避けてください。
5. 調製後、本品の溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。

【成分及び分量】

本品1錠中ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム500mg。添加物として、炭酸水素ナトリウム、アジピン酸、乾燥炭酸ナトリウムを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
4. 衣類等につくと脱色、変色することがありますので注意してください。
5. 殺菌消毒する製品によっては印刷面(文字、絵)、材質など変色・変質することがあります。



製造
番号

使用
期限

お問い合わせ先
吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL.03-3381-2004
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

