

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鎮咳去痰薬

和漢薬エキス配合

第②類医薬品

せき・たん・ぜんそく アスゲン[®]錠EX

アスゲン錠EXは、和漢薬のマオウ・カンゾウのエキスに、ジプロフィリン、無水カフェイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩を配合した、せき・たん・ぜんそくの症状を緩和するお薬です。これらの成分の働きにより、かぜや気道粘膜のアレルギー症状に伴う、せき・たんに優れた効果を示します。また、ぜんそく症状に対しても、気管支をひろげ、たんを切れやすくし、胸の重苦しさを取り、呼吸困難を和らげます。

⚠️【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）
3. 過量服用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください：口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面へ続く)

【効能・効果】

せき、たん、ぜんそく

【用法・用量】

下記1回量を1日3回、毎食後に服用してください。

年齢	成人 (15歳以上)	11歳以上 15歳未満	7歳以上 11歳未満	5歳以上 7歳未満	5歳未満
1回量	3錠	2錠	1.5錠	1錠	服用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)錠剤の取り出し方（PTP品）
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。）



【成分・分量】

灰褐色の割線入りの錠剤で、9錠（成人1日服用量：2.07g）中に、次の成分を含有します。


成分	分量
マオウ乾燥エキス（原生薬として3.45gに相当）	575 mg
カンゾウエキス（原生薬として0.66gに相当）	165 mg
無水カフェイン	120 mg
ジプロフィリン	150 mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8.2 mg

添加物として、メタケイ酸アルミン酸Mg、トウモロコシデンブ、D-マンニトール、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mgを含有します。

※本剤は、和漢薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4)ピンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。（ピン入品）
- (5)本剤をめれた手で取り扱わないでください。（水分が錠剤に付くと、変色又は色むらを生じることがあります。）
- (6)ピンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。（ピン入品）
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電話 03-3370-7174(代表)

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

製造販売元 **アスケン製薬株式会社**
岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008