

ビタミン含有保健薬

滋養強壮・
肉体疲労時の
栄養補給

キューピーコーワゴールドα-プラス

生活環境がめまぐるしく変化する現代社会。仕事・家事・ストレス・睡眠不足などにより、「からだに疲れが残る」、「翌朝疲れがとれない」といった症状は日常的に起きています。疲れているのに休養がとれない状態が続くと、からだ全体に疲れが蓄積し、一晩休んだぐらいではなかなか疲れが抜けなくなってしまうようになります。こうしたからだの疲れには、キューピーコーワゴールドα-プラスが効果的です。本剤には4種の滋養強壮生薬に加え、L-アルギニン塩酸塩と5種のビタミンが同時配合されており、すぐれた効果を発揮します。1回わずか1錠。しかも1日1回の服用でも、よく効くように出来ています。

からだ全体の疲れやだるさを感じた時、疲れがたまってしまった時には、早めにキューピーコーワゴールドα-プラスを服用して対処してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- ④ しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠 ○	1~2回
15歳未満の小児	✕ 服用しないこと	

- 朝・昼・晩、食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。
(1日2回服用する場合は、1回目の服用から6時間以上間隔をあけられることをおすすめします。)

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

(裏面へ続く)

成分・分量(2錠中)

成分・分量	働 き
トウキ乾燥エキス 25.0mg (トウキとして 100mg)	トウキの根から抽出された成分で、血流をよくすることでからだの疲れに効くと同時に、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
エゾウコギ乾燥エキス 14.0mg (エゾウコギとして 350mg)	エゾウコギの根から抽出された成分で、疲れに効くと同時に、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
オウギ乾燥エキス 30.0mg (オウギとして 240mg)	キバナオウギの根から抽出された成分で、生体内の新陳代謝を高め、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
オキソアミチン末 50.0mg	ニンニクから抽出された成分で、ニンニク特有のニオイがおさえてあり、からだの調子が悪い時、すぐれた滋養強壮効果をあらわします。
L-アルギニン塩酸塩 50.0mg	アミノ酸の一種で、からだに元気がない時、エネルギー源の合成・貯蔵を促進します。
チアミン硝化物 (V.B1) 10.0mg	疲れたからだに必要な5種のビタミンが補給され、栄養物のエネルギー化を促します。
リボフラビン (V.B2) 4.0mg	
ピリドキシン塩酸塩 (V.B6) 10.0mg	
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 〔dl- α -トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として 20mg〕 20.7mg	
L-アスコルビン酸ナトリウム 〔L-アスコルビン酸 (V.C) として 100mg〕 112.6mg	
無水カフェイン 50.0mg	中枢神経に働いて、疲れに効きます。

〔添加物〕ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、アラビアゴム、炭酸Ca、ゼラチン、リン酸水素Na、酸化チタン、黄色五号、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意> ビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- ⑤容器の中の詰め物(ビニール)は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。
- ⑥容器のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- ⑦容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、外箱に入れて保管するなど、取扱いに注意してください。
- ⑧外箱及びラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。
- ⑨使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。



本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間: 月~金(祝日を除く)9:00~17:00



●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Languages

<https://hc.kowa.co.jp/otc/tenpu>



この台紙は、服用の際にはよく読み、大切に保管してください。

ビタミン含有保健薬 **第3類医薬品**

キューピーコーワゴールドαプラス

△使用上の注意/☎相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●効能・効果/滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

●用法・用量/成人(15歳以上)1回1錠、1日1~2回水又は温湯で服用してください。

※朝・昼・晩、食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。(1日2回服用する場合は、1回目の服用から6時間以上間隔をあけられることをおすすめします。)

〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を厳守してください。

●成分・分量(2錠中)/トウキ乾燥エキス25.0mg(トウキとして100mg)、エゾウコギ乾燥エキス14.0mg(エゾウコギとして350mg)、オウギ乾燥エキス30.0mg(オウギとして240mg)、オキソアミジン末50.0mg、L-アルギニン塩酸塩50.0mg、チアミン硝酸塩(V.B₁)10.0mg、リボフラビン(V.B₂)4.0mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B₆)10.0mg、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム20.7mg〔dl-α-トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として20mg〕、L-アスコルビン酸ナトリウム112.6mg〔L-アスコルビン酸(V.C)として100mg〕、無水カフェイン50.0mg

〔添加物〕ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、白糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、アラビアゴム、炭酸Ca、ゼラチン、リン酸水素Na、酸化チタン、黄色五号、カルナウバロウ

〈成分・分量に関連する注意〉ビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

●保管及び取扱い上の注意/(1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。(5)容器のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。(6)容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、取扱いに注意してください。(7)ラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。(8)使用期限(台紙及び容器に記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755
月~金(祝日を除く)9:00~17:00

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



◀開け口



製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

A
R9K